

汛期动物炭疽防控要点

汛期是炭疽高发期。特别是洪涝灾害后，暴雨冲刷导致炭疽疫源地土壤中的炭疽芽孢杆菌暴露地表，增加炭疽发生和流行风险。应强化以下防疫措施。

强化免疫



1 确保炭疽新老疫区，特别是江河流域、地势低洼地带饲养的牲畜处于有效免疫保护状态，及时补免。

2 接种疫苗的空瓶、污染的注射器和容器等需要进行高压灭菌或者彻底焚烧。



强化排查报告



3 加大重点监测疫源地和高风险区家畜排查力度和频次。



4 对出现突然死亡、天然孔出血、血液呈酱油色且不易凝固、尸僵不全、腹膨胀等症状的动物，严禁剖检。



5 一旦发现病死及死因不明动物，要立即诊断，及时处置，迅速上报。


强化应急处置



6 加强疫苗、消毒药等应急物资储备。一旦出现突发疫情，要坚决果断处置，确保不发生扩散蔓延。



7 严格按照《炭疽防治技术规范》要求，对发病动物进行不放血扑杀和无害化处理，对圈舍环境进行严格彻底消毒，同时做好人员防护。



8 在炭疽病死动物的掩埋点应设立永久性警示标志，禁止在周边放牧。

强化监管



9 加强运输环节和屠宰环节监管，严格查验动物检疫合格证明和运载车辆备案情况，防止染疫或疑似染疫家畜进入流通环节。

10 严格执行不准宰杀、不准食用、不准出售、不准转运病(淹)死动物，对死亡动物进行无害化处理的“四不准一处理”措施。



强化人员防护

11 从事动物防疫、检疫、实验室检测和饲养、屠宰、畜产品及皮张加工的人员应注意个人防护。



12 参与疫情处置的有关人员穿防护服和胶靴，戴防护口罩和双层乳胶手套。处置完毕后，接受健康检查，出现不良症状时及时就医。