

福建省农业农村厅文件

福建省农业农村厅关于 2025 年审定和 撤销主要农作物品种的通告

(2025 年 18 号)

经福建省主要农作物品种审定委员会九届四次主任委员会会议审定和农业农村部官网公示(自 2025 年 7 月 9 日至 7 月 29 日),现将审定通过的水稻、玉米、大豆等 3 类主要农作物 45 个品种,撤销审定的 119 个水稻品种予以公布。

撤销审定品种自本通告发布之日起停止生产、广告,自本通告发布一个生产周期后停止推广、销售。

- 附件：1. 2025 年福建省审定通过主要农作物品种目录
2. 2025 年福建省审定通过主要农作物品种简介与
审定意见
3. 福建省撤销审定主要农作物品种目录（第十一批）

福建省农业农村厅

2025 年 8 月 6 日

（此件主动公开）

2025年福建省审定通过主要农作物品种目录

序号	审定编号	作物种类	品种名称	品种来源	试验渠道	申请者	育种者	适宜种植范围	选育人员
1	闽审稻 20251001	水稻	启优9703	启源A×福恢 9703	统一试验	福建金品农业科技股份有限公司	福建省农业科学院水稻研究所、福建金品农业科技股份有限公司	福建省作早稻种植	杨德卫、张以华、蔡巨广、胡荣华、董敬铨、何旒清、陈华、游年顺、黄进武、陈红英、黄珊
2	闽审稻 20251002	水稻	清优7954	清达A×浙恢 7954	统一试验	三明市沙县区农业科学研究所	三明市沙县区农业科学研究所、福建省农业科学院水稻研究所	福建省稻瘟病轻发区作早稻种植	吴光煌、房贤涛、肖世温、陈春霞、郑会坦、王洪飞、董瑞霞、游晴如、黄秀泉、郑建华、黄庭旭
3	闽审稻 20251003	水稻	榕盛优2121	榕盛A×金恢 2121	统一试验	福建省福瑞华安种业科技有限公司、福建农林大学	福建农林大学、福建省福瑞华安种业科技有限公司	福建省作早稻种植	夏法刚、陈志伟、潘明、官华忠、章清杞、潘润森、毛大梅、唐定中、周元昌、靳丽
4	闽审稻 20251004	水稻	野香优902	野香 A×HR902	统一试验	三明市沙县区农业科学研究所	三明市沙县区农业科学研究所、福建禾丰种业股份有限公司、广西绿海种业股份有限公司	福建省作中稻种植	吴光煌、黄秀泉、陈俊长、胡万星、胡凌峰、罗木旺、陈开武、罗光宁
5	闽审稻 20251005	水稻	义两优6915	义S×福恢 6915	统一试验	福建省福瑞华安种业科技有限公司	福建省农业科学院水稻研究所、福建省福瑞华安种业科技有限公司	福建省作中稻种植	洪永河、沈绪波、郑菲艳、雷仲明、涂诗航、黄少飞、周鹏、胡荣华、陈春霞、郑冢团
6	闽审稻 20251006	水稻	榕两优2153	榕夏S×福恢 2153	统一试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所、安徽佳一谷都农业科技有限公司	福建省稻瘟病轻发区作中稻种植	杨东、蒋家煊、涂诗航、陈秋实、周鹏、郑长林、蔡巨广、郑菲艳、张以华、洪永河、胡荣华、朱永生
7	闽审稻 20251007	水稻	榕夏两优香占	榕夏S×闽华 香占	统一试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所、安徽佳一谷都农业科技有限公司	福建省作中稻种植	杨东、郑菲艳、陈荣、郑长林、周鹏、陈华、张以华、洪永河、蔡巨广、胡荣华、朱永生、李清华

序号	审定编号	作物种类	品种名称	品种来源	试验渠道	申请者	育种者	适宜种植范围	选育人员
8	闽审稻 20251008	水稻	明两优808	明S×福恢 808	统一试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所、湖南杂交水稻研究中心	福建省作中稻种植	陈春霞、彭锐、董瑞霞、彭既明、房贤涛、王洪飞、游晴如、郑建华、黄庭旭
9	闽审稻 20251009	水稻	禾两优631	禾9S×福恢 631	统一试验	福建兴禾种业科技有限公司	福建省农业科学院水稻研究所、福建兴禾种业科技有限公司、福建农林大学作物遗传改良研究所、福建禾丰种业股份有限公司	福建省作中稻种植	张建福、陈志伟、朱永生、官华忠、吴方喜、毛大梅、陈永发、章清杞、蔡秋华、陈俊长
10	闽审稻 20251010	水稻	潢优699	潢达A×福恢 699	统一试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所	福建省作晚稻种植	蒋家煥、陈春霞、蔡秋华、董瑞霞、朱永生、房贤涛、陈丽萍、王洪飞、黄庭旭、吴方喜
11	闽审稻 20251011	水稻	野香优2153	野香A×福恢 2153	统一试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所、福建禾丰种业股份有限公司、广西绿海种业股份有限公司	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	郑长林、杨东、刘俊麟、陈俊长、杨帆、陈秋实
12	闽审稻 20251012	水稻	福泰优601	福泰1A×福恢 601	统一试验	福建丰田种业有限公司	福建丰田种业有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、福建宏福农业科技有限公司	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	方珊珊、唐修平、沈伟锋、潘德灼、杨官畅、郭文晖、刘玉芹、赵明富
13	闽审稻 20251013	水稻	N两优988	N15S×JMR98 8	统一试验	建阳民丰农作物品种研究所	建阳民丰农作物品种研究所、福建省南平市农业科学研究所、武夷山科力兴种业有限公司、福建君和生物科技有限公司	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	邱慧明、周仕全、江文清、张振斌、马妙明、饶溶晖、石良文、彭吕清、王怀富
14	闽审稻 20251014	水稻	谷优福源香	谷丰A×福源 香3号	统一试验	福建金品农业科技股份有限公司	福建省农业科学院水稻研究所、福建金品农业科技股份有限公司	福建省作晚稻种植	陈华、蔡巨广、张以华、董敬铨、胡荣华、游年顺、黄进武、陈红英

序号	审定编号	作物种类	品种名称	品种来源	试验渠道	申请者	育种者	适宜种植范围	选育人员
15	闽审稻 20251015	水稻	甬优99	甬粳10号 A×F277	统一试验	宁波种业股份有限公司	宁波种业股份有限公司	福建省稻瘟病轻发 区作晚稻种植	马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋、唐志明、马炜炜、王晓乐、陈志新、周卓奇、张文凭、叶徐明、蔡亭康
16	闽审稻 20251016	水稻	N两优208	N15S×兴恢 208	统一试验	武夷山科力兴种业有限公司	武夷山科力兴种业股份有限公司、福建省南平市农业科学研究所、福建君和生物科技有限公司	福建省作晚稻种植	江文清、周仕全、邱慧明、饶溶晖、马妙明、张振斌、王怀富、石良文、彭吕清
17	闽审稻 20253001	水稻	榕夏两优6832	榕夏S×禾恢 6832	联合体试验	福建禾丰种业股份有限公司	福建禾丰种业股份有限公司、福建省农业科学院水稻研究所	福建省作中稻种植	黄达彪、李齐向、周鹏、陈代尧、杨长桃、张丽春、郑会坦、连彬、罗丽平、谢文佳
18	闽审稻 20253002	水稻	锦两优钰禾	锦S×钰禾	联合体试验	福建农林大学	福建农林大学、中国水稻研究所	福建省稻瘟病轻发 区作中稻种植	官华忠、毛一剑、陈志伟、毛大梅、章清杞、夏法刚、潘润森
19	闽审稻 20253003	水稻	锦两优755	锦S×金恢 755	联合体试验	福建农林大学	福建农林大学	福建省稻瘟病轻发 区作中稻种植	陈志伟、官华忠、毛大梅、章清杞、潘明、潘润森、夏法刚、周元昌、唐定中
20	闽审稻 20253004	水稻	锦两优699	锦S×福恢 699	联合体试验	福建农林大学	福建农林大学、福建省农业科学院水稻研究所	福建省作中稻种植	官华忠、朱永生、毛大梅、董瑞霞、陈志伟、蔡秋华、潘润森、蒋家煥、周元昌、吴方喜
21	闽审稻 20253005	水稻	原长优52	原长 5A×YR912	联合体试验	武夷山科力兴种业有限公司、浙江科原种业有限公司	武夷山科力兴种业股份有限公司、浙江科原种业有限公司	福建省作中稻种植	马国华、江文清、吕旭健、马妙明、杨洪燕、张振斌、周仕全、饶溶晖、邱慧明、石良文、彭吕清、王怀富
22	闽审稻 20253006	水稻	运邦两优六三 丝苗	运邦63S×六 三丝苗	联合体试验	福建六三种业有限责任公司	福建六三种业有限责任公司、福建省化六三种业有限责任公司	福建省稻瘟病轻发 区作中稻种植	陈家银、陈建军、雷伏贵、张小中、孟志国、段誉昌、吴永强、宋宇榕、曹珊珊
23	闽审稻 20253007	水稻	丁两优源占	丁源S×福源 占2号	联合体试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所	福建省稻瘟病轻发 区作晚稻种植	张以华、蔡巨广、胡荣华、游年顺、黄进武、陈红英

序号	审定编号	作物种类	品种名称	品种来源	试验渠道	申请者	育种者	适宜种植范围	选育人员
24	闽审稻 20253008	水稻	杉两优665	杉农S×荃恢 665	联合体试 验	福建省农业科学院生物技术研究所	福建省农业科学院生物技术研究所、科荃种业股份有限公司	福建省作晚稻种植	王锋、陈建民、王志超、吴明基、罗伟强、温怀常、陈在杰
25	闽审稻 20253009	水稻	智谷优628	智谷A×荃恢 628	联合体试 验	福建省农业科学院生物技术研究所	福建省农业科学院生物技术研究所、科荃种业股份有限公司	福建省作晚稻种植	王锋、陈建民、王志超、陈在杰、温怀常、吴明基、宋辉、周敏
26	闽审稻 20253010	水稻	智谷优636	智谷A×荃恢 636	联合体试 验	福建省农业科学院生物技术研究所	福建省农业科学院生物技术研究所、科荃种业股份有限公司	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	王锋、陈建民、王志超、林艳、温怀常、吴明基、罗伟强、宋辉
27	闽审稻 20253011	水稻	杉两优682	杉农S×荃恢 682	联合体试 验	科荃种业股份有限公司	科荃种业股份有限公司	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	王锋、黎明、王志超、陈建民、罗伟强、温怀常、黄瑶、周敏
28	闽审稻 20253012	水稻	宁12优粤农丝苗	宁12A×粤农 丝苗	联合体试 验	宁德市农业科学研究所	宁德市农业科学研究所、广东省农业科学研究所水稻研究所	福建省作晚稻种植	陈若平、何秀英、汤凯毅、巫浩翔、吴国灿、陈腾奎、程云铃、林超、林毓乐、刘舜花、王雄荣、李想、詹丹、雷丽丽
29	闽审稻 20253013	水稻	福兴优318	福兴A×南恢 318	联合体试 验	福建省南平市农业科学研究所	福建省南平市农业科学研究所、福建农林大学农业学院	福建省作晚稻种植	张振斌、陈志伟、马妙明、毛大梅、邱慧明、官华忠、刘端华、潘润森、谢冬容、周仕全、石良文、彭吕清、王怀富
30	闽审稻 20253014	水稻	君两优106	君S×南恢 106	联合体试 验	福建省南平市农业科学研究所	福建省南平市农业科学研究所、福建君和生物科技有限公司、武夷山科力兴种业有限公司	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	马妙明、张振斌、邱慧明、周仕全、谢冬容、刘端华、彭吕清、王怀富、石良文、饶溶晖
31	闽审稻 20253015	水稻	君两优209	君S×兴恢 209	联合体试 验	武夷山科力兴种业有限公司	武夷山科力兴种业有限公司、福建省南平市农业科学研究所、福建君和生物科技有限公司	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	周仕全、邱慧明、江文清、饶溶晖、马妙明、张振斌、彭吕清、王怀富、石良文

序号	审定编号	作物种类	品种名称	品种来源	试验渠道	申请者	育种者	适宜种植范围	选育人员
32	闽审稻 20253016	水稻	品香优2026	品香A×明恢 2026	联合体试验	三明市农业科学研究院	三明市农业科学研究院、 四川省农业科学院水稻高粱研究所（四川省农科院德阳分院）	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	邹文广、张涛、马彬林、杨旺兴、卓伟、蒋开锋、侯新坡、许旭明、范祖军、杨腾帮、张受刚、杨国星
33	闽审稻 20253017	水稻	拾两优703	拾S×祥恢 703	联合体试验	福建农乐种业有限公司	福建农乐种业有限公司、 株洲市农业科学研究院	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	谢晓娟、石天宝、池有奏、粟文俊、张维亮、王琳玉、陈居民、郑昌德
34	闽审稻 20253018	水稻	厦两优7165	厦禾7S×佳禾165	联合体试验	厦门大学生命科学学院	厦门大学生命科学学院	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	黄荣裕、郑景生、江良荣、欧阳鑫昊、崔玉超、钟新斌、吴银旺、黄育民
35	闽审稻 20253019	水稻	明太优229	明太A×明恢 229	联合体试验	福建六三种业有限责任公司	福建六三种业有限责任公司、 三明市农业科学研究院、 福建省农业科学院作物研究所、 福州立信种苗有限公司	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	杨旺兴、邹文广、侯新坡、卓伟、马彬林、陈家银、许旭明、范祖军、杨腾帮、张受刚、杨国星
36	闽审玉 20251001	玉米	华闽甜糯1号	闽糯系 Wn68×闽甜系Mt401	统一试验	福建欣华闽种业有限公司	福建欣华闽种业有限公司、 福建省农业科学院作物研究所、 福州立信种苗有限公司	福建省种植	林建新、廖长见、张扬、詹鹏麟、许静、刘建平、卢和顶、陈山虎、林伟银
37	闽审玉 20251002	玉米	中航糯802	H886×H956	统一试验	北京华奥农科玉育种开发有限公司	北京华奥农科玉育种开发有限公司	福建省种植	黄伟民
38	闽审玉 20251003	玉米	闽甜糯7号	闽糯系 WF19×闽甜系N232	统一试验	福建省农业科学院作物研究所	福建省农业科学院作物研究所	福建省种植	林建新、廖长见、庄炜、詹鹏麟、许静、张扬、卢和顶、陈山虎、许孚
39	闽审玉 20251004	玉米	闽甜428	闽甜系 4623×闽甜系JR8609	统一试验	福建省农业科学院作物研究所	福建省农业科学院作物研究所	福建省种植	张扬、廖长见、庄炜、许静、詹鹏麟、林建新、卢和顶、陈山虎、许孚

序号	审定编号	作物种类	品种名称	品种来源	试验渠道	申请者	育种者	适宜种植范围	选育人员
40	闽审玉 20251005	玉米	甜黄玉1号	GMC001×闽 甜系JR8609	统一试验	福建省农业科学院生物 技术研究所	福建省农业科学院生物技 术研究所、福建省农业科 学院作物研究所	福建省种植	林雅容、廖长见、陈子强、张扬 、郭新睿、卢和顶、李刚、陈山 虎、颜静宛、胡昌泉
41	闽审玉 20251006	玉米	双萃302	WM704×WT13 4	统一试验	福州金苗种业有限公司	福州金苗种业有限公司	福建省种植	胡建清、吴若希、习思远、吴国 强
42	闽审玉 20253001	玉米	闽双甜887	闽甜系 AS82×闽甜 系AG87	联合体试 验	福建省农业科学院作物 研究所	福建省农业科学院作物研 究所	福建省种植	廖长见、卢和顶、张扬、陈山虎 、林建新
43	闽审玉 20253002	玉米	雪甜199	200W×DS199	联合体试 验	福州金苗种业有限公司	福州金苗种业有限公司	福建省种植	吴国强、习思远、吴若希、胡建 清
44	闽审玉 20253003	玉米	圣甜翡月	SHY817- PS13-6505- 04×SYW- 6SSLM804	联合体试 验	圣尼斯种子（北京）有 限公司	圣尼斯种子（北京）有限 公司、圣尼斯蔬菜种子有 限公司	福建省种植	
45	闽审豆 20251001	大豆	华夏11	华夏3号/粤 夏114	统一试验	华南农业大学	华南农业大学	福建省夏播种植	程艳波、年海、陈博、蔡占东、 王应祥、马启彬、连腾祥、曹亚 琴、刘玉涛、葛良法

附件 2

2025 年福建省审定通过主要农作物品种简介与 审定意见

一、水稻

1、审定编号：闽审稻 20251001

品种名称：启优 9703

申请单位：福建金品农业科技股份有限公司

育种单位：福建省农业科学院水稻研究所、福建金品农业科技股份有限公司

品种来源：启源 A × 福恢 9703

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作早稻种植，平均全生育期 128.8 天，比对照 T78 优 2155 迟熟 1.1 天。平均株高 103.6 厘米，穗长 23.5 厘米，每亩有效穗数 17.8 万穗，每穗总粒数 142.0 粒，结实率 80.1%，千粒重 29.6 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 1.8、1.9，穗颈瘟损失率最高级 1 级，抗稻瘟病，高感白叶枯病。米质主要指标：糙米率 80.8%，整精米率 62.0%，粒长 7.2 毫米，长宽比 3.0，垩白度 3.6%，透明度 2 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 80 毫米，直链淀粉含量 14.6%，米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2021 年参加福建省早稻迟熟组区域试验，平均亩产 522.6 千克，比对照 T78 优 2155 增产 1.1%；2022 年续试，平

均亩产 488.1 千克，比对照 T78 优 2155 增产 1.3%；两年区域试验平均亩产 505.3 千克，比对照 T78 优 2155 增产 1.2%；2023 年生产试验，平均亩产 520.3 千克，比对照 T78 优 2155 增产 11.0%。

栽培技术要点：在福建省作早稻种植，一般 3 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.0 叶左右，秧龄控制在 35 天以内。栽插株行距 18.0 厘米×22.0 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 8 万以上。科学施肥，每亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.5:1。磷肥全部作基肥，氮肥和钾肥按基肥、蘖肥、穗肥比例为 5:3:2 施用。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治纹枯病、螟虫和稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：启优 9703 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作早稻种植。

2、审定编号：闽审稻 20251002

品种名称：清优 7954

申请单位：三明市沙县区农业科学研究所

育种单位：三明市沙县区农业科学研究所、福建省农业科学院水稻研究所

品种来源：清达 A×浙恢 7954

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作早稻种植，平均全生育期 128.9 天，比对照 T78 优 2155 迟熟 0.8 天。平均株

高 100.5 厘米，穗长 20.9 厘米，每亩有效穗数 17.9 万穗，每穗总粒数 156.8 粒，结实率 80.6%，千粒重 26.8 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 3.2、3.0，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感白背飞虱。米质主要指标：糙米率 81.7%，整精米率 63.2%，粒长 6.7 毫米，长宽比 2.6，垩白度 5.7%，透明度 2 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 50 毫米，直链淀粉含量 21.3%，米质普通。

产量表现：2022 年参加福建省早稻迟熟组区域试验，平均亩产 501.7 千克，比对照 T78 优 2155 增产 4.1%；2023 年续试，平均亩产 561.2 千克，比对照 T78 优 2155 增产 4.8%；两年区域试验平均亩产 531.4 千克，比对照 T78 优 2155 增产 4.4%；2024 年生产试验，平均亩产 502.5 千克，比对照 T78 优 2155 增产 4.8%。

栽培技术要点：在福建省作早稻种植，一般 2 月下旬 3 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米×20.0 厘米，每蔸插 1~2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，早施分蘖肥，配施有机肥及磷、钾肥，亩施纯氮 10 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水管理，收割前 7~10 天断水。重点防治稻瘟病、白叶枯病、稻飞虱病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：清优 7954 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作早稻种植。

3、审定编号：闽审稻 20251003

品种名称：榕盛优 2121

申请单位：福建省福瑞华安种业科技有限公司、福建农林大学

育种单位：福建农林大学、福建省福瑞华安种业科技有限公司

品种来源：榕盛 A × 金恢 2121

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作早稻种植，平均全生育期 127.7 天，比对照 T78 优 2155 早熟 0.2 天。平均株高 105.4 厘米，穗长 23.0 厘米，每亩有效穗数 17.8 万穗，每穗总粒数 149.6 粒，结实率 81.7%，千粒重 27.2 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.5、2.1，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感白背飞虱。米质主要指标：糙米率 79.5%，整精米率 53.7%，粒长 7.2 毫米，长宽比 3.2，垩白度 2.3%，透明度 2 级，碱消值 4.0 级，胶稠度 81 毫米，直链淀粉含量 15.3%，米质普通。

产量表现：2022 年参加福建省早稻迟熟组区域试验，平均亩产 478.6 千克，比对照 T78 优 2155 增产 1.1%；2023 年续试，平均亩产 549.6 千克，比对照 T78 优 2155 增产 2.6%；两年区域试验平均亩产 518.6 千克，比对照 T78 优 2155 增产 1.9%；2024 年生产试验，平均亩产 499.7 千克，比对照 T78 优 2155 增产 3.9%。

栽培技术要点：在福建省作早稻种植，一般 2 月下旬 3 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距

20.0 厘米×20.0 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.8:0.8，基肥、分蘖肥、穗肥、粒肥比例 5:3:1:1。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治白叶枯病、稻飞虱、螟虫等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见:榕盛优 2121 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作早稻种植。

4、审定编号:闽审稻 20251004

品种名称:野香优 902

申请单位:三明市沙县区农业科学研究所

育种单位:三明市沙县区农业科学研究所、福建禾丰种业股份有限公司、广西绿海种业有限公司

品种来源:野香 A×HR902

特征特性:属籼型三系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 136.7 天，比对照 II 优 3301 早熟 4.8 天。平均株高 126.2 厘米，穗长 23.2 厘米，每亩有效穗数 15.6 万穗，每穗总粒数 192.6 粒，结实率 87.9%，千粒重 24.6 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 3.3、2.3，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；中感白叶枯病。米质主要指标:糙米率 81.3%，整精米率 67.6%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.5，垩白度 0.4%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 78 毫米，直链淀粉含量 16.2%，米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2021 年参加福建省中稻组区域试验，平均亩产 580.7 千克，比对照 II 优 3301 减产 4.2%；2022 年续试，平均亩产 622.8 千克，比对照 II 优 3301 减产 4.6%；两年区域试验平均亩产 601.7 千克，比对照 II 优 3301 减产 4.4%；2022 年生产试验，平均亩产 590.7 千克，比对照 II 优 3301 增产 3.1%。

栽培技术要点：在福建省作中稻种植，一般 4 月中旬~5 月中旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×23.1 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 7 万以上。科学施肥，施足基肥，早施分蘖肥。亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.5:0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治白叶枯病、稻曲病、稻飞虱、稻纵卷叶螟等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：野香优 902 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作中稻种植。

5、审定编号：闽审稻 20251005

品种名称：义两优 6915

申请单位：福建省福瑞华安种业科技有限公司

育种单位：福建省农业科学院水稻研究所、福建省福瑞华安种业科技有限公司

品种来源：义 S×福恢 6915

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，

平均全生育期 139.7 天，比对照 II 优 3301 早熟 1.9 天。平均株高 117.5 厘米，穗长 23.3 厘米，每亩有效穗数 16.1 万穗，每穗总粒数 174.4 粒，结实率 86.7%，千粒重 27.6 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.9、2.3，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；感白叶枯病。米质主要指标：糙米率 80.7%，整精米率 59.1%，粒长 7.5 毫米，长宽比 3.5，垩白度 0.9%，透明度 1 级，碱消值 4.1 级，胶稠度 84 毫米，直链淀粉含量 15.2%，米质普通。

产量表现：2021 年参加福建省中稻组区域试验，平均亩产 615.6 千克，比对照 II 优 3301 增产 1.5%；2022 年续试，平均亩产 653.9 千克，比对照 II 优 3301 增产 2.8%；两年区域试验平均亩产 634.7 千克，比对照 II 优 3301 增产 2.2%；2023 年生产试验，平均亩产 588.6 千克，比对照禾两优 676 增产 2.5%。

栽培技术要点：在福建省作中稻种植，一般 4 月下旬～5 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1.2～1.5 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×25.0 厘米，每蔸插 2～3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，在施足基肥的基础上，应早施分蘖肥，适施穗肥和粒肥，适当加大钾肥用量。亩施纯氮 12～14 千克，氮磷钾比例为 1:0.4:1。常规水分管理，收割前 7～10 天断水。重点防治稻飞虱、稻纵卷叶螟、白叶枯病等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：义两优 6915 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作中稻种植。

6、审定编号：闽审稻 20251006

品种名称：榕两优 2153

申请单位：福建省农业科学院水稻研究所

育种单位：福建省农业科学院水稻研究所、安徽佳一谷都农业科技有限公司

品种来源：榕夏 S × 福恢 2153

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 135.1 天，2022 年比对照 II 优 3301 早熟 3.2 天，2023 年比对照禾两优 676 早熟 4.9 天。平均株高 110.7 厘米，穗长 23.7 厘米，每亩有效穗数 17.1 万穗，每穗总粒数 190.9 粒，结实率 86.1%，千粒重 25.6 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.3、2.7，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 80.4%，整精米率 70.2%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.5，垩白度 0.4%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 67 毫米，直链淀粉含量 14.9%，米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加福建省中稻组区域试验，平均亩产 630.2 千克，比对照 II 优 3301 减产 0.9%；2023 年续试，平均亩产 638.5 千克，比对照禾两优 676 增产 0.7%；两年区域试验平均亩产 634.4 千克，比对照（II 优 3301、禾两优 676）减产 0.1%；2023 年生产试验，平均亩产 601.6 千克，比对照禾两优 676 增产 3.3%。

栽培技术要点：在福建省作中稻种植，一般4月下旬~5月上旬播种，秧田播种量每亩10千克，大田亩用种量1~1.25千克。水育秧移栽叶龄5.5叶左右，秧龄控制在30天以内。栽插株行距20.0厘米×23.3厘米，每蔸插2~3粒谷秧，每亩插足基本苗6万以上。科学施肥，在施足基肥的基础上，应早施分蘖肥，适施穗肥和粒肥，适当加大钾肥用量。亩施纯氮12千克，氮磷钾比例为1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前7~10天断水。重点防治白叶枯病、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：榕两优2153符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作中稻种植。

7、审定编号：闽审稻20251007

品种名称：榕夏两优香占

申请单位：福建省农业科学院水稻研究所

育种单位：福建省农业科学院水稻研究所、安徽佳一谷都农业科技有限公司

品种来源：榕夏S×闽华香占

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期138.3天，2022年比对照Ⅱ优3301早熟2.4天，2023年比对照禾两优676早熟2.2天。平均株高105.5厘米，穗长23.4厘米，每亩有效穗数17.1万穗，每穗总粒数186.8粒，

结实率 88.0%，千粒重 25.3 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 1.9、2.3，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 80.8%，整精米率 60.4%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.6，垩白度 0.5%，透明度 1 级，碱消值 6.7 级，胶稠度 71 毫米，直链淀粉含量 15.7%，米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加福建省中稻组区域试验，平均亩产 632.0 千克，比对照 II 优 3301 减产 3.1%；2023 年续试，平均亩产 635.6 千克，比对照禾两优 676 增产 2.2%；两年区域试验平均亩产 633.8 千克，比对照（II 优 3301、禾两优 676）减产 0.5%；2023 年生产试验，平均亩产 584.5 千克，比对照禾两优 676 增产 1.3%。

栽培技术要点：在福建省作中稻种植，一般 4 月下旬～5 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1～1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×23.3 厘米，每蔸插 2～3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，在施足基肥的基础上，应早施分蘖肥，适施穗肥和粒肥，适当加大钾肥用量。亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7～10 天断水。重点防治白叶枯病、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：榕夏两优香占符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作中稻种植。

8、审定编号：闽审稻 20251008

品种名称：明两优 808

申请单位：福建省农业科学院水稻研究所

育种单位：福建省农业科学院水稻研究所、湖南杂交水稻研究中心

品种来源：明 S × 福恢 808

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 140.3 天，2022 年比对照 II 优 3301 迟熟 2.2 天，2023 年比对照禾两优 676 迟熟 1.0 天。平均株高 121.5 厘米，穗长 24.3 厘米，每亩有效穗数 17.5 万，每穗总粒数 174.8 粒，结实率 86.6%，千粒重 25.9 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.6、1.8，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 79.9%，整精米率 65.6%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.0，垩白度 1.9%，透明度 1 级，碱消值 5.2 级，胶稠度 83 毫米，直链淀粉含量 25.8%，米质普通。

产量表现：2022 年参加福建省中稻组区域试验，平均亩产 646.7 千克，比对照 II 优 3301 减产 0.1%；2023 年续试，平均亩产 655.0 千克，比对照禾两优 676 增产 5.3%；两年区试平均亩产 650.9 千克，比对照（II 优 3301、禾两优 676）增产 2.6%；2024 年生产试验，平均亩产 589.1 千克，比对照禾两优 676 减产 1.4%。

栽培技术要点：在福建省作中稻种植，一般 4 月中下旬至 5 月中旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千

克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米 × 26.7 厘米，每蔸插 1~2 粒谷秧，每亩插足基本苗 5 万以上。科学施肥，施足基肥，早施追肥，配施有机肥及磷、钾肥，亩施纯氮 10 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治螟虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟、纹枯病等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：明两优 808 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作中稻种植。

9、审定编号：闽审稻 20251009

品种名称：禾两优 631

申请单位：福建兴禾种业科技有限公司

育种单位：福建省农业科学院水稻研究所、福建兴禾种业科技有限公司、福建农林大学作物遗传改良研究所、福建禾丰种业股份有限公司

品种来源：禾 9S × 福恢 631

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 132.2 天，比对照禾两优 676 早熟 4.3 天。平均株高 117.0 厘米，穗长 24.5 厘米，每亩有效穗数 16.1 万，每穗总粒数 196.5 粒，结实率 82.9%，千粒重 26.6 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.4、3.0，穗瘟损失率最高级为 3 级，综合评价为中抗稻瘟病；抗白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米

率 80.3%，整精米率 47.0%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.1，垩白度 5%，透明度 3 级，碱消值 4.0 级，胶稠度 84 毫米，直链淀粉含量 14.8%，米质普通。

产量表现：2023 年参加福建省中稻组区域试验，平均亩产 660.4 千克，比对照禾两优 676 增产 4.0%；2024 年续试，平均亩产 621.2 千克，比对照禾两优 676 增产 2.1%。两年区试平均亩产 640.8 千克，比对照禾两优 676 增产 3.0%。2024 年生产试验平均亩产 629.2 千克，比对照禾两优 676 增产 3.9%。

栽培技术要点：在福建省作中稻种植，一般 4 月下旬 5 月上旬播种，秧田播种量每亩 10~15 千克，大田亩用种量 1 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 25~30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×16.7 厘米，每蔸插 1~2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，早施分蘖肥，配施有机肥及磷、钾肥，亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1.0:0.6:0.8。基肥、分蘖肥、穗肥、粒肥比例为 5:3:1:1。常规水分管理，收割前 10~15 天断水。重点防治稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：禾两优 631 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作中稻种植。

10、审定编号：闽审稻 20251010

品种名称：潢优 699

申请单位：福建省农业科学院水稻研究所

育种单位：福建省农业科学院水稻研究所

品种来源：潢达 A × 福恢 699

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 124.4 天，比对照宜优 673 早熟 2.4 天。平均株高 119.0 厘米，穗长 26.1 厘米，每亩有效穗数 14.8 万，每穗总粒数 182.4 粒，结实率 80.25%，千粒重 30.1 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.3、2.6，穗瘟损失率最高级为 3 级，综合评价为中抗稻瘟病。米质主要指标：糙米率 81.3%，整精米率 51.6%，粒长 7.3 毫米，长宽比 3.1，垩白度 2.9%，透明度 2 级，碱消值 5.4 级，胶稠度 84 毫米，直链淀粉含量 13.8%，米质普通。

产量表现：2020 年参加福建省晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 553.79 千克，比对照宜优 673 增产 9.16%；2021 年续试，平均亩产 518.0 千克，比对照宜优 673 增产 6.1%。两年区试平均亩产 535.9 千克，比对照宜优 673 增产 7.6%。2022 年生产试验，平均亩产 493.3 千克，比对照宜优 673 增产 0.6%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月下旬 ~ 7 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 ~ 15 千克，大田亩用种量 1 ~ 1.5 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 25 ~ 30 天。栽插株行距 16.7 厘米 × 20.0 厘米，每蔸插 1 ~ 2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，早施分蘖肥，配施有机肥及磷、钾肥，亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7 ~ 10 天断水。重点防治白叶枯病、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：潢优 699 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作晚稻种植。

11、审定编号：闽审稻 20251011

品种名称：野香优 2153

申请单位：福建省农业科学院水稻研究所

育种单位：福建省农业科学院水稻研究所、福建禾丰种业股份有限公司、广西绿海种业有限公司

品种来源：野香 A × 福恢 2153

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 120.8 天，比对照宜优 673 早熟 2.7 天。平均株高 110.1 厘米，穗长 21.7 厘米，每亩有效穗数 17.5 万穗，每穗总粒数 177.8 粒，结实率 82.5%，千粒重 22.4 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 3.1、2.9，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 80.2%，整精米率 68.3%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.5，垩白度 0.6%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 75 毫米，直链淀粉含量 16.2%，米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2021 年参加福建省晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 518.1 千克，比对照宜优 673 增产 0.9%；2022 年续试，平均亩产 488.2 千克，比对照宜优 673 减产 0.4%；两年区域试验平均亩产 503.1 千克，比对照宜优 673 增产 0.3%；2022 年生产试验，平

均亩产 489.6 千克，比对照宜优 673 增产 7.4%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 5 月下旬～6 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1～1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×23.3 厘米，每蔸插 2～3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，在施足基肥的基础上，应早施分蘖肥，适施穗肥和粒肥，适当加大钾肥用量。亩施纯氮 10 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7～10 天断水。重点防治白叶枯病、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：野香优 2153 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。

12、审定编号：闽审稻 20251012

品种名称：福泰优 601

申请单位：福建丰田种业有限公司

育种单位：福建丰田种业有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、福建宏福农业科技有限公司

品种来源：福泰 1A×福恢 601

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 124.8 天，比对照宜优 673 迟熟 0.7 天。平均株高 108.4 厘米，穗长 24.7 厘米，每亩有效穗数 17.7 万穗，每穗总

粒数 157.2 粒，结实率 77.8%，千粒重 26.5 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 3.4、2.7，穗颈瘟损失率最高级 7 级，感稻瘟病；抗白叶枯病；感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 80.6%，整精米率 57.8%，粒长 7.8 毫米，长宽比 3.9，垩白度 0.2%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 76 毫米，直链淀粉含量 17.4%，米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加福建省晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 502.7 千克，比对照宜优 673 减产 3.0%；2023 年续试，平均亩产 511.0 千克，比对照宜优 673 增产 5.9%；两年区域试验平均亩产 519.6 千克，比对照宜优 673 增产 1.5%；2023 年生产试验，平均亩产 480.7 千克，比对照宜优 673 增产 5.2%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月中旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×23.1 厘米，每蔸插 1~2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，施足基肥，早施追肥，配施有机肥及磷、钾肥，亩施纯氮 10 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治稻瘟病、纹枯病、螟虫、稻纵卷叶螟和稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：福泰优 601 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。

13、审定编号：闽审稻 20251013

品种名称：N 两优 988

申请单位：建阳民丰农作物品种研究所

育种单位：建阳民丰农作物品种研究所、福建省南平市农业科学研究所、武夷山科力兴种业有限公司、福建君和生物科技有限公司

品种来源：N15S × JMR988

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 125.0 天，比对照宜优 673 迟熟 0.8 天。平均株高 105.2 厘米，穗长 22.8 厘米，每亩有效穗数 15.0 万穗，每穗总粒数 188.4 粒，结实率 76.5%，千粒重 27.1 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 5.7、4.5，穗颈瘟损失率最高级 7 级，感稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 81.3%，整精米率 67.6%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.1，垩白度 0.6%，透明度 1 级，碱消值 6.4 级，胶稠度 78 毫米，直链淀粉含量 16.3%，米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加福建省晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 512.9 千克，比对照宜优 673 减产 0.1%；2023 年续试，平均亩产 491.3 千克，比对照宜优 673 减产 1.9%；两年区域试验平均亩产 502.1 千克，比对照宜优 673 减产 1.0%；2023 年生产试验，平均亩产 486.9 千克，比对照宜优 673 增产 4.1%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月上旬 ~ 7 月

中旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.5 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×20.0 厘米，每蔸插 2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，每亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治螟虫、稻瘟病、白叶枯病、褐飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：N 两优 988 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。

14、审定编号：闽审稻 20251014

品种名称：谷优福源香

申请单位：福建金品农业科技股份有限公司

育种单位：福建省农业科学院水稻研究所、福建金品农业科技股份有限公司

品种来源：谷丰 A×福源香 3 号

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 123.1 天，比对照宜优 673 早熟 0.5 天。平均株高 105.9 厘米，穗长 24.5 厘米，每亩有效穗数 16.8 万穗，每穗总粒数 141.3 粒，结实率 85.0%，千粒重 28.0 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.8、2.4，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 80.8%，

整精米率 62.2%，粒长 7.3 毫米，长宽比 3.2，垩白度 3.5%，透明度 2 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 76 毫米，直链淀粉含量 21.9%，米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加福建省晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 523.6 千克，比对照宜优 673 增产 0.6%；2023 年续试，平均亩产 477.8 千克，比对照宜优 673 减产 0.2%；两年区域试验平均亩产 500.7 千克，比对照宜优 673 增产 0.2%；2024 年生产试验，平均亩产 532.8 千克，比对照宜优 673 增产 0.01%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月中下旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.0 叶左右，秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×23.0 厘米，每蔸插 2 粒谷秧，每亩插足基本苗 5 万以上。科学施肥，重施基肥，适量追肥和粒肥施用。亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.5:1；磷肥全部作基肥，氮肥和钾肥按基肥、蘖肥、穗肥比例为 5:3:2 施用。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治纹枯病、白叶枯病、稻飞虱、稻纵卷叶螟等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：谷优福源香符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作晚稻种植。

15、审定编号：闽审稻 20251015

品种名称：甬优 99

申请单位：宁波种业股份有限公司

育种单位：宁波种业股份有限公司

品种来源：甬粳10号A×F277

特征特性：属籼粳交三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期117.7天，比对照宜优673早熟5.4天。平均株高115.3厘米，穗长24.4厘米，每亩有效穗数12.6万穗，每穗总粒数218.1粒，结实率81.9%，千粒重27.7克。稻瘟病综合指数两年平均分别为2.9、3.5，穗颈瘟损失率最高级5级，中感稻瘟病；抗白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率84.1%，整精米率67.4%，粒长6.0毫米，长宽比2.3，垩白度2.3%，透明度2级，碱消值7.0级，胶稠度76毫米，直链淀粉含量13.2%，米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023年参加福建省晚稻迟熟组区域试验，平均亩产500.6千克，比对照宜优673增产2.1%；2024年续试，平均亩产506.6千克，比对照宜优673增产0.8%；两年区域试验平均亩产503.6千克，比对照宜优673增产1.5%；2024年生产试验，平均亩产566.5千克，比对照宜优673增产6.3%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般6月中下旬播种，秧田播种量每亩10千克，大田亩用种量1~1.25千克。水育秧移栽叶龄5.0叶左右，秧龄控制在20天以内。栽插株行距20厘米×20厘米，每蔸插2~3粒谷秧，每亩插足基本苗6万以上。科学施肥，亩施纯氮13~15千克，氮：磷：钾比例为1:0.6:1。常规水管理，收割前7~10天断水。重点防治恶苗病、稻瘟病、

基腐病、稻纵卷叶螟、二化螟及稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见:甬优 99 符合福建省水稻品种审定标准, 通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。

16、审定编号: 闽审稻 20251016

品种名称: N 两优 208

申请单位: 武夷山科力兴种业有限公司

育种单位: 武夷山科力兴种业有限公司、福建省南平市农业科学研究所、福建君和生物科技有限公司

品种来源: N15S × 兴恢 208

特征特性: 属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植, 平均全生育期 123.9 天, 比对照宜优 673 早熟 1.0 天。平均株高 102.5 厘米, 穗长 22.8 厘米, 每亩有效穗数 16.8 万穗, 每穗总粒数 178.3 粒, 结实率 81.7%, 千粒重 23.3 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.8、2.8, 穗颈瘟损失率最高级 3 级, 中抗稻瘟病; 高感白叶枯病; 高感褐飞虱。米质主要指标: 糙米率 81.0%, 整精米率 70.2%, 粒长 6.5 毫米, 长宽比 3.2, 垩白度 0.3%, 透明度 1 级, 碱消值 7.0 级, 胶稠度 77 毫米, 直链淀粉含量 17.0%, 米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现: 2022 年参加福建省晚稻迟熟组区域试验, 平均亩产 509.6 千克, 比对照宜优 673 减产 1.6%; 2023 年续试, 平均亩

产 509.3 千克，比对照宜优 673 增产 1.7%；两年区域试验平均亩产 509.4 千克，与对照宜优 673 相当；2024 年生产试验，平均亩产 555.6 千克，比对照宜优 673 增 4.3%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月上旬～7 月中旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1～1.5 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×20.0 厘米，每蔸插 2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，每亩施纯氮 10 千克，氮磷钾比为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7～10 天断水。重点防治螟虫、白叶枯病、褐飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：N 两优 208 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作晚稻种植。

17、审定编号：闽审稻 20253001

品种名称：榕夏两优 6832

申请单位：福建禾丰种业股份有限公司

育种单位：福建禾丰种业股份有限公司、福建省农业科学院水稻研究所

品种来源：榕夏 S×禾恢 6832

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 133.4 天，2022 年比对照 II 优 3301 早熟 0.5 天，2023 年比对照禾两优 676 早熟 0.6 天。平均株高 113.7 厘米，穗

长 26.3 厘米，每亩有效穗数 15.7 万，每穗总粒数 203.8 粒，结实率 83.5%，千粒重 25.8 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.4、2.3，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；中感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 81.1%，整精米率 60.7%，垩白度 0.2%，透明度 1 级，碱消值 5.3 级，胶稠度 81 毫米，直链淀粉含量 17.2%，米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加三明市种子企业水稻品种试验联合体中稻组区域试验，平均亩产 616.1 千克，比对照 II 优 3301 增产 5.67%；2023 年续试，平均亩产 602.38 千克，比对照禾两优 676 增产 3.92%；两年区域试验平均亩产 609.2 千克，比对照（II 优 3301、禾两优 676）增产 4.8%；2023 年生产试验，平均亩产 617.0 千克，比对照禾两优 676 增产 2.84%。

栽培技术要点：在福建省作中稻种植，一般 4 月中旬～5 月中旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1～1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米×23.1 厘米，每蔸插 2～3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，施足基肥，早施追肥；亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.8:0.8。常规水分管理，收割前 7～10 天断水。根据当地植保部门虫情病报，重点防治稻曲病、螟虫、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：榕夏两优 6832 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作中稻种植。

18、审定编号：闽审稻 20253002

品种名称：锦两优钰禾

申请单位：福建农林大学

育种单位：福建农林大学、中国水稻研究所

品种来源：锦 S × 钰禾

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 135.7 天，2022 年比对照 II 优 3301 早熟 1.9 天，2023 年比对照禾两优 676 早熟 2.9 天。平均株高 117.0 厘米，穗长 23.6 厘米，每亩有效穗数 14.9 万穗，每穗总粒数 243.5 粒，结实率 80.3%，千粒重 23.0 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 3.0、2.6，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；抗白叶枯病，高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 79.8%，整精米率 61.6%，粒长 6.3 毫米，长宽比 3.0，垩白度 1.0%，透明度 2 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 76 毫米，直链淀粉含量 14.4%，米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加福建省金泰科企水稻品种试验联合体中稻组区域试验，平均亩产 569.4 千克，比对照 II 优 3301 减产 3.2%；2023 年续试，平均亩产 638.8 千克，比对照禾两优 676 减产 0.8%；两年区域试验平均亩产 604.1 千克，比对照（II 优 3301、禾两优 676）减产 2.0%；2023 年生产试验，平均亩产 582.3 千克，比对照禾两优 676 减产 1.2%。

栽培技术要点：在福建省作中稻种植，一般 4 月下旬 ~ 5 月

上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×23.0 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.8:0.8，基肥、分蘖肥、穗肥、粒肥比例 5:3:1:1。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治稻瘟病、稻飞虱、螟虫等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：锦两优钰禾符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作中稻种植。

19、审定编号：闽审稻 20253003

品种名称：锦两优 755

申请单位：福建农林大学

育种单位：福建农林大学

品种来源：锦 S×金恢 755

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 130.9 天，2022 年比对照 II 优 3301 早熟 6.9 天，2023 年比对照禾两优 676 早熟 5.7 天。平均株高 113.4 厘米，穗长 23.4 厘米，每亩有效穗数 17.5 万穗，每穗总粒数 202.0 粒，结实率 83.9%，千粒重 22.4 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 3.2、2.7，穗颈瘟损失率最高级 7 级，感稻瘟病；抗白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 81.7%，整精米率 65.8%，粒

长 6.7 毫米，长宽比 3.1，垩白度 0.9%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 70 毫米，直链淀粉含量 17.1%，米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加福建省金泰科企水稻品种试验联合体中稻组区域试验，平均亩产 621.0 千克，比对照 II 优 3301 增产 3.3%；2023 年续试，平均亩产 628.8 千克，比对照禾两优 676 减产 1.6%；两年区域试验平均亩产 624.9 千克，比对照（II 优 3301、禾两优 676）增产 0.8%；2024 年生产试验，平均亩产 568.7 千克，比对照禾两优 676 减产 1.0%。

栽培技术要点：在福建省作中稻种植，一般 4 月下旬～5 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1～1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×23.0 厘米，每蔸插 2～3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.8:0.8，基肥、分蘖肥、穗肥、粒肥比例 5:3:1:1。常规水分管理，收割前 7～10 天断水。重点防治稻瘟病、稻飞虱、螟虫等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：锦两优 755 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作中稻种植。

20、审定编号：闽审稻 20253004

品种名称：锦两优 699

申请单位：福建农林大学

育种单位：福建农林大学、福建省农业科学院水稻研究所

品种来源：锦 S × 福恢 699

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 135.5 天，2022 年比对照 II 优 3301 早熟 1.1 天，2023 年比对照禾两优 676 早熟 2.3 天。平均株高 119.6 厘米，穗长 24.6 厘米，每亩有效穗数 16.4 万穗，每穗总粒数 192.0 粒，结实率 77.8%，千粒重 26.0 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.3、2.1，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；抗白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 80.3%，整精米率 57.1%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.1，垩白度 1.2%，透明度 2 级，碱消值 6.6 级，胶稠度 81 毫米，直链淀粉含量 16.4%，米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加福建省金泰科企水稻品种试验联合体中稻组区域试验，平均亩产 628.0 千克，比对照 II 优 3301 增产 4.4%；2023 年续试，平均亩产 617.0 千克，比对照禾两优 676 减产 3.4%；两年区域试验平均亩产 622.5 千克，比对照（II 优 3301、禾两优 676）增产 0.5%；2024 年生产试验，平均亩产 589.7 千克，比对照禾两优 676 增产 2.7%。

栽培技术要点：在福建省作中稻种植，一般 4 月下旬～5 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1～1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距

20.0 厘米×23.0 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.8:0.8，基肥、分蘖肥、穗肥、粒肥比例 5:3:1:1。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治纹枯病、稻飞虱、螟虫等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：锦两优 699 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作中稻种植。

21、审定编号：闽审稻 20253005

品种名称：原长优 52

申请单位：武夷山科力兴种业有限公司、浙江科原种业有限公司

育种单位：武夷山科力兴种业有限公司、浙江科原种业有限公司

品种来源：原长 5A×YR912

特征特性：属籼粳交三系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 140.6 天，2022 年比对照 II 优 3301 迟熟 4.6 天，2023 年比对照禾两优 676 迟熟 2.2 天。平均株高 122.4 厘米，穗长 24.8 厘米，每亩有效穗数 13.5 万穗，每穗总粒数 236.6 粒，结实率 77.8%，千粒重 26.4 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.1、2.5，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 81.8%，整精米率 68.0%，粒长 6.2 毫米，长宽比 2.4，垩白度 1.4%，透明度 2 级，碱消值 6.0

级，胶稠度 78 毫米，直链淀粉含量 18.0%，米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加福建省金泰科企水稻品种试验联合体中稻组区域试验，平均亩产 623.6 千克，比对照 II 优 3301 增产 3.7%；2023 年续试，平均亩产 626.6 千克，比对照禾两优 676 减产 1.9%；两年区域试验平均亩产 625.1 千克，比对照（II 优 3301、禾两优 676）增产 0.9%；2024 年生产试验，平均亩产 564.6 千克，比对照禾两优 676 减产 1.7%。

栽培技术要点：在福建省作中稻种植，一般 4 月下~5 月中旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20 厘米×23.1 厘米，每蔸插 2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，每亩施纯氮 11 千克，氮磷钾比为 1:0.7:0.9。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治螟虫、白叶枯病、褐飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：原长优 52 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作中稻种植。

22、审定编号：闽审稻 20253006

品种名称：运邦两优六三丝苗

申请单位：福建六三种业有限责任公司

育种单位：福建六三种业有限责任公司、福建宁化六三种业

有限责任公司

品种来源：运邦 63S × 六三丝苗

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 130.3 天，比对照禾两优 676 早熟 5.5 天。平均株高 106.9 厘米，穗长 24.8 厘米，每亩有效穗数 18.1 万穗，每穗总粒数 184.6 粒，结实率 81.9%，千粒重 26.9 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.1、2.6，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 79.3%，整精米率 60.5%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.6，垩白度 1.0%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 67 毫米，直链淀粉含量 15.1%，米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加三明市种子企业水稻品种试验联合体中稻组区域试验，平均亩产 595.0 千克，比对照禾两优 676 增产 2.7%；2024 年并入参加福建丰源科企水稻品种试验联合体中稻组区域试验，平均亩产 652.3 千克，比对照禾两优 676 减产 2.1%；两年区域试验平均亩产 623.7 千克，比对照禾两优 676 增产 0.3%；2024 年生产试验，平均亩产 603.1 千克，比对照禾两优 676 减产 1.6%。

栽培技术要点：在福建省作中稻种植，一般 4 月下旬 ~ 5 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1 ~ 1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米 × 23.3 厘米，每蔸插 2 ~ 3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6

万以上。科学施肥，施足基肥，需肥量中等，控施氮肥，增施磷钾肥。亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治纹枯病、稻瘟病、稻螟虫、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：运邦两优六三丝苗符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作中稻种植。

23、审定编号：闽审稻 20253007

品种名称：丁两优源占

申请单位：福建省农业科学院水稻研究所

育种单位：福建省农业科学院水稻研究所

品种来源：丁源 S×福源占 2 号

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 123.0 天，比对照天优华占迟熟 2.3 天。平均株高 106.2 厘米，穗长 24.1 厘米，每亩有效穗数 19.9 万穗，每穗总粒数 171.9 粒，结实率 85.2%，千粒重 25.5 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 1.6、2.5，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；感白叶枯病。米质主要指标：糙米率 81.1%，整精米率 67.0%，粒长 7.0 毫米，长宽比 3.2，垩白度 1.3%，透明度 2 级，碱消值 6.4 级，胶稠度 73 毫米，直链淀粉含量 16.1%，米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2021 年参加福建省闽佳科企水稻试验联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 578.4 千克，比对照天优华占增产 2.6%；2022 年续试，平均亩产 618.7 千克，比对照天优华占增产 4.8%；两年区域试验平均亩产 598.6 千克，比对照天优华占增产 3.7%；2023 年生产试验，平均亩产 565.2 千克，比对照天优华占减产 0.2%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月下旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.0 叶左右，秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 18.0 厘米×23.0 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 8 万以上。科学施肥，每亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.5:1。磷肥全部作基肥，氮肥和钾肥按基肥：蘖肥：穗肥比例为 5:3:2 施用。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治纹枯病、螟虫、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：丁两优源占符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。

24、审定编号：闽审稻 20253008

品种名称：杉两优 665

申请单位：福建省农业科学院生物技术研究所

育种单位：福建省农业科学院生物技术研究所、科荟种业股

份有限公司

品种来源：杉农 S × 荟恢 665

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 118.1 天，比对照天优华占早熟 2.2 天。平均株高 113.9 厘米，穗长 24.5 厘米，每亩有效穗数 17.6 万穗，每穗总粒数 169.8 粒，结实率 82.9%，千粒重 26.5 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.4、2.7，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 78.6%，整精米率 64.5%，粒长 7.6 毫米，长宽比 4.4，垩白度 1.3%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 17.4%，米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加科荟种业优质稻品种试验联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 608.7 千克，比对照天优华占增产 4.5%；2023 年续试，平均亩产 608.9 千克，比对照天优华占增产 5.8%；两年区域试验平均亩产 608.8 千克，比对照天优华占增产 5.2%；2023 年生产试验，平均亩产 604.5 千克，比对照天优华占增产 5.3%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月下旬 ~ 7 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1 ~ 1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米 × 23.1 厘米，每蔸插 2 ~ 3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，重施基肥，早施追肥，巧施穗肥，适当增施

磷、钾肥。亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。基肥、分蘖肥、穗肥、粒肥比例为 5:3:1:1。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治纹枯病、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：杉两优 665 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作晚稻种植。

25、审定编号：闽审稻 20253009

品种名称：智谷优 628

申请单位：福建省农业科学院生物技术研究所

育种单位：福建省农业科学院生物技术研究所、科荟种业股份有限公司

品种来源：智谷 A × 荟恢 628

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 119.8 天，比对照天优华占早熟 0.5 天。平均株高 108.6 厘米，穗长 25.1 厘米，每亩有效穗数 17.3 万穗，每穗总粒数 180.6 粒，结实率 81.6%，千粒重 25.4 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.3、2.5，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 82.5%，整精米率 69.4%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.4，垩白度 2.1%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 18.4%，米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加科荟种业优质稻品种试验联合体晚稻

中熟组区域试验，平均亩产 606.7 千克，比对照天优华占增产 4.2%；2023 年续试，平均亩产 611.8 千克，比对照天优华占增产 6.3%；两年区域试验平均亩产 609.3 千克，比对照天优华占增产 5.3%；2023 年生产试验，平均亩产 600.8 千克，比对照天优华占增产 4.7%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月下旬～7 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1～1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米×23.1 厘米，每蔸插 2～3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，重施基肥，早施追肥，巧施穗肥，适当增施磷、钾肥。亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。磷肥全部作基肥，氮肥和钾肥按基肥:蘖肥:穗肥比例 5:3:2 施用。常规水分管理，收割前 7～10 天断水。重点防治纹枯病、白叶枯病、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：智谷优 628 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作晚稻种植。

26、审定编号：闽审稻 20253010

品种名称：智谷优 636

品种名称：智谷优 636

申请单位：福建省农业科学院生物技术研究所以

育种单位：福建省农业科学院生物技术研究所以、科荟种业股

份有限公司

品种来源：智谷 A × 荟恢 636

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 118.9 天，比对照天优华占早熟 1.3 天。平均株高 108.5 厘米，穗长 25.3 厘米，每亩有效穗数 19.1 万穗，每穗总粒数 187.8 粒，结实率 80.5%，千粒重 23.4 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.7、2.3，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 82.1%，整精米率 70.6%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.4，垩白度 1.0%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 18.6%，米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加科荟种业优质稻品种试验联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 604.1 千克，比对照天优华占增产 3.7%；2023 年续试，平均亩产 593.8 千克，比对照天优华占增产 3.2%；两年区域试验平均亩产 599.0 千克，比对照天优华占增产 3.5%；2023 年生产试验，平均亩产 596.5 千克，比对照天优华占增产 3.9%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月下旬 ~ 7 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1 ~ 1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米 × 23.1 厘米，每蔸插 2 ~ 3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，施足基肥，早施追肥，配施有机肥及磷、钾

肥，每亩施纯氮 10~12 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治稻瘟病、纹枯病、白叶枯病、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：智谷优 636 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。

27、审定编号：闽审稻 20253011

品种名称：杉两优 682

申请单位：科荟种业股份有限公司

育种单位：科荟种业股份有限公司

品种来源：杉农 S × 荟恢 682

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 119.8 天，比对照天优华占早熟 0.5 天。平均株高 113.2 厘米，穗长 24.7 厘米，每亩有效穗数 17.2 万穗，每穗总粒数 195.9 粒，结实率 81.0%，千粒重 25.1 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.9、3.0，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 77.5%，整精米率 63.6%，粒长 7.6 毫米，长宽比 4.4，垩白度 1.4%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.8%，米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加科荟种业优质稻品种试验联合体晚稻

中熟组区域试验，平均亩产 610.9 克，比对照天优华占增产 4.9%；2023 年续试，平均亩产 595.1 千克，比对照天优华占增产 3.4%；两年区域试验平均亩产 603.0 千克，比对照天优华占增产 4.2%；2023 年生产试验，平均亩产 595.1 千克，比对照天优华占增产 3.7%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月下旬～7 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1～1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米×23.1 厘米，每蔸插 2～3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，早施分蘖肥，配施有机肥及磷、钾肥，每亩施纯氮 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7～10 天断水。重点防治稻瘟病、纹枯病、白叶枯病、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：杉两优 682 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。

28、审定编号：闽审稻 20253012

品种名称：宁 12 优粤农丝苗

申请单位：宁德市农业科学研究所

育种单位：宁德市农业科学研究所、广东省农业科学院水稻研究所

品种来源：宁 12A × 粤农丝苗

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 121.7 天，比对照天优华占迟熟 1.1 天。平均株高 110.0 厘米，穗长 23.9 厘米，每亩有效穗数 18.1 万穗，每穗总粒数 163.8 粒，结实率 85.4%，千粒重 25.4 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 3.1、3.0，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 82.2%，整精米率 65.7%，粒长 7.3 毫米，长宽比 3.6，垩白度 0.4%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 72 毫米，直链淀粉含量 15.6%，米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加福建省金泰科企水稻品种试验联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 565.8 千克，比对照天优华占减产 1.7%；2023 年续试，平均亩产 552.8 千克，比对照天优华占增产 1.9%；两年区域试验平均亩产 559.3 千克，比对照天优华占增产 0.1%；2023 年生产试验，平均亩产 526.0 千克，比对照天优华占增产 1.8%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月下旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 19.8 厘米 × 19.8 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，早施分蘖肥，配施有机肥及磷、钾肥，亩施纯氮 11 千克，氮磷钾比例为 1:0.5:0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天

断水。重点防治白叶枯病、纹枯病、螟虫、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见: 宁 12 优粤农丝苗符合福建省水稻品种审定标准, 通过审定。适宜在福建省作晚稻种植。

29、审定编号: 闽审稻 20253013

品种名称: 福兴优 318

申请单位: 福建省南平市农业科学研究所

育种单位: 福建省南平市农业科学研究所、福建农林大学农学院

品种来源: 福兴 A × 南恢 318

特征特性: 属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植, 平均全生育期 120.2 天, 比对照天优华占早熟 0.4 天。平均株高 101.7 厘米, 穗长 24.2 厘米, 每亩有效穗数 17.8 万穗, 每穗总粒数 181.8 粒, 结实率 79.8%, 千粒重 24.7 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.7、2.3, 穗颈瘟损失率最高级 3 级, 中抗稻瘟病; 高感白叶枯病; 高感褐飞虱。米质主要指标: 糙米率 82.3%, 整精米率 64.8%, 粒长 6.9 毫米, 长宽比 3.2, 垩白度 0.5%, 透明度 1 级, 碱消值 7.0 级, 胶稠度 70 毫米, 直链淀粉含量 17.0%, 米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现: 2022 年参加福建省金泰科企水稻品种试验联合体晚稻中熟组区域试验, 平均亩产 575.9 千克, 比对照天优华占增

产 0.0%；2023 年续试，平均亩产 521.7 千克，比对照天优华占减产 3.9%；两年区域试验平均亩产 548.8 千克，比对照天优华占减产 1.9%；2024 年生产试验，平均亩产 540.9 千克，比对照天优华占增产 5.9%。

栽培技术要点：在福建省晚稻种植，一般 6 月中旬～7 月下旬播种，秧田播种量每亩 15 千克，大田亩用种量 0.75～1.0 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20 厘米×20～23.1 厘米，每蔸插 2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，亩施纯氮 11 千克，氮磷钾比例为 1:0.7:0.9。常规水分管理，收割前 7～10 天断水。重点防治螟虫、白叶枯病、褐飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：福兴优 318 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省作晚稻种植。

30、审定编号：闽审稻 20253014

品种名称：君两优 106

申请单位：福建省南平市农业科学研究所

育种单位：福建省南平市农业科学研究所、福建君和生物科技有限公司、武夷山科力兴种业有限公司

品种来源：君 S×南恢 106

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 121.9 天，比对照天优华占迟熟 1.7 天。平均株高

105.3 厘米，穗长 23.0 厘米，每亩有效穗数 17.5 万穗，每穗总粒数 203.5 粒，结实率 79.7%，千粒重 22.6 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.8、2.8，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 81.2%，整精米率 66.2%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.4，垩白度 0.7%，透明度 1 级，碱消值 6.8 级，胶稠度 74 毫米，直链淀粉含量 16.8%，米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加福建省金泰科企水稻品种试验联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 580.7 千克，比对照天优华占减产 0.6%；2023 年续试，平均亩产 533.6 千克，比对照天优华占增产 2.2%；两年区域试验平均亩产 557.1 千克，比对照天优华占增产 0.8%；2023 年生产试验，平均亩产 536.3 千克，比对照天优华占增产 4.3%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月上旬~7 月中旬播种，秧田播种量每亩 15 千克，大田亩用种量 0.75~1.0 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20 厘米×20~23.1 厘米，每蔸插 2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，每亩施纯氮 11 千克，氮磷钾比为 1:0.7:0.9。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治螟虫、稻瘟病、白叶枯病、褐飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：君两优 106 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区

作晚稻种植。

31、审定编号：闽审稻 20253015

品种名称：君两优 209

申请单位：武夷山科力兴种业有限公司

育种单位：武夷山科力兴种业有限公司、福建省南平市农业科学研究所、福建君和生物科技有限公司

品种来源：君 S × 兴恢 209

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 120.2 天，比对照天优华占迟熟 0.7 天。平均株高 104.8 厘米，穗长 23.6 厘米，每亩有效穗数 17.2 万穗，每穗总粒数 209.4 粒，结实率 82.0%，千粒重 20.6 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.5、3.2，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 82.0%，整精米率 69.6%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.2，垩白度 0.7%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 70 毫米，直链淀粉含量 15.2%，米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建省金泰科企水稻品种试验联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 549.1 千克，比对照天优华占增产 5.2%；2024 年续试，平均亩产 539.8 千克，比对照天优华占增产 0.3%；两年区域试验平均亩产 544.4 千克，比对照天优华占增产 2.8%；2024 年生产试验，平均亩产 526.9 千克，比对照天优华

占增产 3.2%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月上旬～7 月中旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1～1.5 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×20.0 厘米，每蔸插 2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，每亩施纯氮 11 千克，氮磷钾比为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7～10 天断水。重点防治螟虫、稻瘟病、白叶枯病、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：君两优 209 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。

32、审定编号：闽审稻 20253016

品种名称：品香优 2026

申请单位：三明市农业科学研究院

育种单位：三明市农业科学研究院、四川省农业科学院水稻高粱研究所（四川省农科院德阳分院）

品种来源：品香 A×明恢 2026

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 121.0 天，比对照宜优 673 早熟 3.6 天。平均株高 112.3 厘米，穗长 26.3 厘米，每亩有效穗数 17.5 万，每穗总粒数 180.8 粒，结实率 80.3%，千粒重 25.4 克。稻瘟病综合指数两

年平均分别为 3.0、2.9，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 79.7%，整精米率 69.1%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.5，垩白度为 0.1%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 74 毫米，直链淀粉含量 16.3%，米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加福建省科研单位水稻品种试验联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 544.4 千克，比对照宜优 673 增产 1.1%；2023 年续试，平均亩产 526.3 千克，比对照宜优 673 减产 0.4%；两年区域试验平均亩产 535.3 千克，比对照宜优 673 增产 0.3%；2023 年生产试验，平均亩产 514.9 千克，比对照宜优 673 增产 2.3%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月中旬播种，秧田播种量每亩 11 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 23.1 厘米×23.1 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，重施基肥，早施分蘖肥，配施有机肥及磷、钾肥，亩施纯氮 10~12 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治纹枯病、稻瘟病、稻螟虫、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：品香优 2026 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。

33、审定编号：闽审稻 20253017

品种名称：拾两优 703

申请单位：福建农乐种业有限公司

育种单位：福建农乐种业有限公司、株洲市农业科学研究所

品种来源：拾 S × 祥恢 703

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 121.1 天，比对照宜优 673 早熟 2.9 天。平均株高 110.9 厘米，穗长 23.3 厘米，每亩有效穗数 17.7 万穗，每穗总粒数 161.5 粒，结实率 90.1%，千粒重 24.5 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.8、2.5，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；抗白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 80.7%，整精米率 63.8%，粒长 7.2 毫米，长宽比 3.7，垳白度 0.8%，透明度 1 级，碱消值 7 级，胶稠度 76 毫米，直链淀粉含量 15.3%，米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加三明市稻种基地福建晚籼科企联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 556.9 千克，比对照宜优 673 增产 4.6%；2024 年并入参加福建丰源科企水稻品种试验联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 541.4 千克，比对照宜优 673 增产 4.3%；两年区域试验平均亩产 549.2 千克，比对照宜优 673 增产 4.5%；2024 年生产试验，平均亩产 566.3 千克，比对照宜优 673 增产 1.4%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月上旬～6 月中旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1～1.25 千克。

水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米 × 23.1 厘米，每蔸插 2 ~ 3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，采取重施底肥，早施追肥，后期严控偏施氮肥。亩施纯氮 10 千克，氮磷钾比例为 1: 0.5: 1。常规水分管理，收割前 7 ~ 10 天断水。重点防治螟虫、稻瘟病、褐飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：拾两优 703 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。

34、审定编号：闽审稻 20253018

品种名称：厦两优 7165

申请单位：厦门大学生命科学学院

育种单位：厦门大学生命科学学院

品种来源：厦禾 7S × 佳禾 165

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 122.6 天，比对照宜优 673 早熟 1.4 天。平均株高 107.4 厘米，穗长 24.9 厘米，每亩有效穗数 17.4 万穗，每穗总粒数 207.1 粒，结实率 83.9%，千粒重 22.9 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.6、3.3，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 82.2%，整精米率 65.4%，粒长 7.0 毫米，长宽比 3.4，垩白度 0.8%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 75 毫米，直链淀粉含量 14.7%，

米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加三明市稻种基地晚粳科企联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 561.5 千克，比对照宜优 673 增产 5.5%；2024 年并入参加福建丰源科企水稻品种试验联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 562.1 千克，比对照宜优 673 增产 8.3%；两年区域试验平均亩产 561.8 千克，比对照宜优 673 增产 6.9%；2024 年生产试验，平均亩产 597.3 千克，比对照宜优 673 增产 7.4%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月中下旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 19.8 厘米×23.1 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 5 万以上。科学施肥，栽培上重施基肥，早施分蘖肥，配施有机肥及磷、钾肥。亩施纯氮 11 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治稻瘟病、白叶枯病及螟虫、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：厦两优 7165 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。

35、审定编号：闽审稻 20253019

品种名称：明太优 229

申请单位：福建六三种业有限责任公司

育种单位：福建六三种业有限责任公司、三明市农业科学研究院、福建宁化六三种业有限责任公司

品种来源：明太 A × 明恢 229

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 123.2 天，比对照宜优 673 早熟 0.9 天。平均株高 108.6 厘米，穗长 24.7 厘米，每亩有效穗数 18.0 万穗，每穗总粒数 200.1 粒，结实率 79.9%，千粒重 24.6 克。稻瘟病综合指数两年平均分别为 2.4、3.6，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 81.7%，整精米率 62.5%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.2，垩白度 1.5%，透明度 1 级，碱消值 6 级，胶稠度 78 毫米，直链淀粉含量 15.4%，米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加三明市稻种基地晚籼科企联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 571.0 千克，比对照宜优 673 增产 7.3%；2024 年并入参加福建丰源科企水稻品种试验联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 547.8 千克，比对照宜优 673 增产 5.6%；两年区域试验平均亩产 559.4 千克，比对照宜优 673 增产 6.4%；2024 年生产试验，平均亩产 568.9 千克，比对照宜优 673 增产 1.3%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月上旬～6 月中旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1～1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 16.7 厘米 × 20.0 厘米，每蔸插 2～3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6

万以上。科学施肥，重施基肥，早施分蘖肥，配施有机肥及磷、钾肥。亩施纯氮 10 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治纹枯病、稻瘟病、稻螟虫、稻飞虱等病虫害。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：明太优 229 符合福建省水稻品种审定标准，通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。

二、玉米

36、审定编号：闽审玉 20251001

品种名称：华闽甜糯 1 号

申请单位：福建欣华闽种业有限公司

选育单位：福建欣华闽种业有限公司、福建省农业科学院作物研究所、福州立信种苗有限公司

品种来源：闽糯系 Wn68 × 闽甜系 Mt401

特征特性：属鲜食甜加糯玉米品种。春播出苗至鲜穗采收 85.6 天，2022 年与对照苏玉糯 5 号相当，2023 年比对照苏玉糯 5 号迟熟 0.3 天。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，花药绿色，颖壳绿色，花丝绿色。株型半紧凑，平均株高 214.3 厘米，穗位高 90.1 厘米，果穗长锥型，穗长 19.5 厘米，穗粗 5.3 厘米，秃尖长 0.8 厘米，穗行数 14.8 行，行粒数 35.2 粒，白粒白轴，鲜百粒重 43.0 克，鲜出籽率 67.5%。倒伏率 0%，倒折率 0%。两年田间调查抗纹枯病、

抗大斑病、抗小斑病、抗南方锈病、抗茎腐病、抗粗缩病；两年人工接菌鉴定中抗纹枯病、抗大斑病、感小斑病、中抗南方锈病、感腐霉茎腐病。品质分析：皮渣率 10.5%，支链淀粉占总淀粉含量 98.6%。外观及品尝鉴定 89.0 分。

产量表现：2022 年参加福建省糯玉米组区域试验，鲜果穗平均亩产 1002.3 千克，比对照苏玉糯 5 号增产 35.2%。2023 年续试，鲜果穗平均亩产 1162.4 千克，比对照苏玉糯 5 号增产 36.8%。两年平均鲜果穗亩产 1082.3 千克，比对照苏玉糯 5 号增产 36.0%。

栽培技术要点：适时播种，春播 3 月中旬至 4 月中旬。与其它玉米采取空间或时间隔离，防止串粉。亩种植密度 3000~3500 株。春播多雨注意排水。施足基肥，以有机肥为主，并亩施氮磷钾复合肥 30~35 千克，酸性土壤宜增施土壤调节剂；拔节期结合中耕培土增施尿素 10 千克、复合肥 15 千克；大喇叭口期后增施尿素 10 千克、复合肥 10 千克；开花前后增施钾肥，亩用量 10 千克。注意防治茎腐病、小斑病及玉米螟等病虫害。适时采收。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：华闽甜糯 1 号符合福建省鲜食玉米品种审定标准，通过审定。适宜福建省种植。

37、审定编号：闽审玉 20251002

品种名称：中航糯 802

申请单位：北京华奥农科玉育种开发有限责任公司

选育单位：北京华奥农科玉育种开发有限责任公司

品种来源：H886 × H956

特征特性：属鲜食甜加糯玉米品种。春播出苗至鲜穗采收 82.6 天，2023 年比对照苏玉糯 5 号迟熟 1.1 天，2024 年比对照万农甜糯 158 迟熟 1.6 天。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，花药紫色，颖壳绿色，花丝浅紫色。株型半紧凑，平均株高 207.1 厘米，穗位高 77.6 厘米，果穗长锥型，穗长 18.9 厘米，穗粗 5.6 厘米，秃尖长 0.6 厘米，穗行数 15.3 行，行粒数 36.3 粒，白粒白轴，鲜百粒重 41.5 克，鲜出籽率 69.2%。倒伏率 0.0%，倒折率 0.0%。两年田间调查抗纹枯病、抗大斑病、抗小斑病、抗南方锈病、抗茎腐病、抗粗缩病；两年人工接菌鉴定感纹枯病、感大斑病、感小斑病、感南方锈病、中抗腐霉茎腐病。品质分析：皮渣率 11.3%，支链淀粉占总淀粉含量 98.0%。外观及品尝鉴评 86.7 分。

产量表现：2023 年参加福建省糯玉米组区域试验，鲜果穗平均亩产 1198.6 千克，比对照苏玉糯 5 号增产 41.0%。2024 年续试，鲜果穗平均亩产 1035.8 千克，比对照万农甜糯 158 增产 6.8%。两年平均鲜果穗亩产 1117.2 千克，比对照（苏玉糯 5 号、万农甜糯 158）增产 22.8%。

栽培技术要点：适时播种，春播 3 月中旬至 4 月中旬。注意隔离，与其它玉米采取空间或时间隔离，防止串粉影响品质。合理密植，亩种植密度 3000 ~ 3500 株。春播多雨注意排水，防止苗期涝害。施足基肥，基肥以有机肥为主，并亩施氮磷钾复合肥 30 ~ 35 千克，酸性土壤宜增施土壤调节剂；拔节期结合中耕培土施用

尿素 10 千克、复合肥 15 千克；大喇叭口期后施用尿素 10 千克、复合肥 10 千克；开花前后增施钾肥，亩用量 10 千克。注意防治纹枯病、大斑病、小斑病、南方锈病及玉米螟等病虫害。适时采收，一般在授粉后 23~26 天采收。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：中航糯 802 符合福建省鲜食玉米品种审定标准，通过审定。适宜福建省种植。

38、审定编号：闽审玉 20251003

品种名称：闽甜糯 7 号

申请单位：福建省农业科学院作物研究所

选育单位：福建省农业科学院作物研究所

品种来源：闽糯系 WF19 × 闽甜系 N232

特征特性：属鲜食甜加糯玉米品种。春播出苗至鲜穗采收 82.3 天，2023 年比对照苏玉糯 5 号早熟 0.3 天，2024 年比对照万农甜糯 158 迟熟 1.6 天。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，花药绿色，颖壳绿色，花丝绿色。株型半紧凑，平均株高 201.1 厘米，穗位高 68.7 厘米，果穗长锥型，穗长 18.8 厘米，穗粗 5.5 厘米，秃尖长 0.2 厘米，穗行数 14.2 行，行粒数 35.8 粒，白粒白轴，鲜百粒重 45.7 克，鲜出籽率 66.4%。倒伏率 0%，倒折率 0.1%。两年田间调查抗纹枯病、抗大斑病、抗小斑病、抗南方锈病、抗茎腐病、抗粗缩病；两年人工接菌鉴定感纹枯病，中抗大斑病、高感小斑病、高感南方锈病、感腐霉茎腐病。品质分析：皮渣率 12.0%，支链淀

粉占总淀粉含量 98.7%。外观及品尝鉴评 88.1 分。

产量表现：2023 年参加福建省糯玉米组区域试验，鲜果穗平均亩产 1214.5 千克，比对照苏玉糯 5 号增产 42.9%。2024 年续试，鲜果穗平均亩产 1073.3 千克，比对照万农甜糯 158 增产 10.7%。两年平均鲜果穗亩产 1143.9 千克，比对照（苏玉糯 5 号、万农甜糯 158）增产 25.8%。

栽培技术要点：适时播种，春播 3 月中旬至 4 月中旬。与其它玉米采取空间或时间隔离，防止串粉。亩种植密度 3000~3200 株。春播多雨注意排水。施足基肥，基肥以有机肥为主，并亩施氮磷钾复合肥 30~35 千克，酸性土壤宜增施土壤调节剂；拔节期结合中耕培土施用尿素 10 千克、复合肥 15 千克；大喇叭口期后施用尿素 10 千克、复合肥 10 千克；开花前后增施钾肥，亩用量 10 千克。注意防治纹枯病、小斑病、南方锈病、茎腐病、玉米螟等病虫害。适时采收。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：闽甜糯 7 号符合福建省鲜食玉米品种审定标准，通过审定。适宜福建省种植。

39、审定编号：闽审玉 20251004

品种名称：闽甜 428

申请单位：福建省农业科学院作物研究所

选育单位：福建省农业科学院作物研究所

品种来源：闽甜系 4623×闽甜系 JR8609

特征特性:属鲜食甜玉米品种。春播出苗至鲜穗采收 80.4 天，2023 年比对照粤甜 16 号早熟 2.4 天，2024 年比对照闽双色 6 号迟熟 1.6 天。幼苗叶鞘绿色，叶片绿色，花药绿色，颖壳绿色，花丝绿色。株型半紧凑，平均株高 202.5 厘米，穗位高 59.2 厘米，果穗长筒型，穗长 21.3 厘米，穗粗 5.6 厘米，秃尖长 1.7 厘米，穗行数 16.6 行，行粒数 39.4 粒，黄粒白轴，鲜百粒重 40.6 克，出籽率 66.2%。倒伏率 0.0%，倒折率 0.0%。两年田间调查抗纹枯病、中抗大斑病、抗小斑病、抗南方锈病、抗茎腐病、抗粗缩病；两年人工接菌鉴定感纹枯病、感大斑病、感小斑病、高感南方锈病、中抗腐霉茎腐病。品质分析：皮渣率 10.07%，可溶性总糖 12.54%，还原糖 1.8%。外观及品尝鉴定 86.6 分。

产量表现:2023 年参加福建省甜玉米组区域试验，鲜果穗平均亩产 1227.7 千克，比对照粤甜 16 号增产 18.6%。2024 年续试，鲜果穗平均亩产 1134.1 千克，比对照闽双色 6 号增产 12.9%。两年平均鲜果穗亩产 1180.9 千克，比对照（粤甜 16 号、闽双色 6 号）增产 15.8%。

栽培技术要点:适时播种，春播 3 月中旬至 4 月中旬。与其它玉米采取空间或时间隔离，防止串粉。亩种植密度 3000~3500 株。春播多雨注意排水。施足基肥，基肥以有机肥为主，并亩施氮磷钾复合肥 30~35 千克，酸性土壤宜增施土壤调节剂；拔节期结合中耕培土增施尿素 10 千克、复合肥 15 千克；大喇叭口期后增施尿素 10 千克、复合肥 10 千克；开花前后增施钾肥，亩用量

10 千克。注意防治纹枯病、大斑病、小斑病、南方锈病、玉米螟等病虫害。适时采收。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：闽甜 428 符合福建省鲜食玉米品种审定标准，通过审定。适宜福建省种植。

40、审定编号：闽审玉 20251005

品种名称：甜黄玉 1 号

申请单位：福建省农业科学院生物技术研究所

选育单位：福建省农业科学院生物技术研究所、福建省农业科学院作物研究所

品种来源：GMC001 × 闽甜系 JR8609

特征特性：属鲜食甜玉米品种。春播出苗至鲜穗采收 83.4 天，2023 年比对照粤甜 16 号迟熟 0.6 天，2024 年比对照闽双色 6 号迟熟 4.5 天。幼苗叶鞘绿色，叶片绿色，花药绿色，颖壳绿色，花丝绿色。株型半紧凑，平均株高 225.5 厘米，穗位高 69.9 厘米，果穗长筒型，穗长 20.7 厘米，穗粗 5.3 厘米，秃尖长 0.5 厘米，穗行数 14.7 行，行粒数 40.3 粒，黄粒白轴，鲜百粒重 39.6 克，出籽率 67.3%。倒伏率 0.0%，倒折率 0.0%。两年田间调查抗纹枯病、抗大斑病、抗小斑病、抗南方锈病、抗茎腐病、抗粗缩病；两年人工接菌鉴定感纹枯病、感大斑病、感小斑病、感南方锈病、感腐霉茎腐病。品质分析：皮渣率 10.3%，可溶性总糖 14.3%，还原糖 3.6%。外观及品尝鉴定 86.7 分。

产量表现：2023 年参加福建省甜玉米组区域试验，鲜果穗平均亩产 1200.0 千克，比对照粤甜 16 号增产 16.0%。2024 年续试，鲜果穗平均亩产 1091.9 千克，比对照闽双色 6 号增产 8.7%。两年平均鲜果穗亩产 1146.0 千克，比对照（粤甜 16 号、闽双色 6 号）增产 12.4%。

栽培技术要点：适时播种，春播 3 月中旬至 4 月中旬。与其它玉米采取空间或时间隔离，防止串粉。亩种植密度 3000~3200 株，穴播 2~3 粒，盖细土厚 2 厘米，3 叶期定苗，穴留壮苗 1 株。春播多雨注意排水。施足基肥，基肥以有机肥为主，并亩施氮磷钾复合肥 30~35 千克，酸性土壤宜增施土壤调节剂；拔节期结合中耕培土增施尿素 10 千克、复合肥 15 千克；大喇叭口期后增施尿素 10 千克、复合肥 10 千克；开花前后增施钾肥，亩用量 10 千克。注意防治纹枯病、大斑病、小斑病、南方锈病、茎腐病和玉米螟等病虫害。适时采收。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：甜黄玉 1 号符合福建省鲜食玉米品种审定标准，通过审定。适宜福建省种植。

41、审定编号：闽审玉 20251006

品种名称：双萃 302

申请单位：福州金苗种业有限公司

选育单位：福州金苗种业有限公司

品种来源：WM704 × WT134

特征特性:属鲜食甜玉米品种。春播出苗至采收 76.7 天,2023 年比对照粤甜 16 号早熟 5.0 天,2024 年比对照闽双色 6 号早熟 3.2 天。幼苗叶鞘绿色,叶片绿色,花药绿色,颖壳绿色,花丝绿色。株型半紧凑,平均株高 174.3 厘米,穗位高 42.4 厘米,果穗长筒型,穗长 20.3 厘米,穗粗 5.0 厘米,秃尖长 0.8 厘米,穗行数 15.6 行,行粒数 36.7 粒,黄白粒白轴,鲜百粒重 38.5 克,出籽率 73.2%。倒伏率 0.0%,倒折率 0.0%。两年田间调查感纹枯病、抗大斑病、抗小斑病、抗南方锈病、抗茎腐病、抗粗缩病;两年人工接菌鉴定高感纹枯病、感大斑病、感小斑病、中抗南方锈病、感腐霉茎腐病。品质分析:皮渣率 7.33%,可溶性总糖 16.27%,还原糖 5.2%。外观及品尝鉴定 88.6 分。

产量表现:2023 年参加福建省甜玉米组区域试验,鲜果穗平均亩产 984.9 千克,比对照粤甜 16 号减产 4.8%。2024 年续试,鲜果穗平均亩产 978.3 千克,比对照闽双色 6 号减产 2.6%。两年平均鲜果穗亩产 981.6 千克,比对照(粤甜 16 号、闽双色 6 号)减产 3.7%。

栽培技术要点:适时播种,春播 2 月下旬至 3 月下旬,秋播 8 月中旬至 9 月上旬。与其它玉米采取空间或时间隔离,防止串粉。亩种植密度 3000~3200 株。春播多雨注意排水。施足基肥,基肥以有机肥为主,并亩施氮磷钾复合肥 30~35 千克,酸性土壤宜增施土壤调节剂;拔节期结合中耕培土增施尿素 10 千克、复合肥 15 千克;大喇叭口期后增施尿素 10 千克、复合肥 10 千克;开

花前后增施钾肥，亩用量 10 千克。注意防治纹枯病、大斑病、小斑病、茎腐病、玉米螟等病虫害。适时采收，一般在授粉后 20 天左右采收。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：双萃 302 符合福建省鲜食玉米品种审定标准，通过审定。适宜福建省种植。

42、审定编号：闽审玉 20253001

品种名称：闽双甜 887

申请单位：福建省农业科学院作物研究所

选育单位：福建省农业科学院作物研究所

品种来源：闽甜系 AS82 × 闽甜系 AG87

特征特性：属鲜食甜玉米品种。春播出苗至鲜穗采收 73.6 天，2023 年比对照粤甜 16 号早熟 7.0 天，2024 年比对照闽双色 6 号早熟 5.6 天。幼苗叶鞘绿色，叶片绿色，花药绿色，颖壳绿色，花丝绿色。株型半紧凑，平均株高 162.6 厘米，穗位高 40.1 厘米，果穗长筒型，穗长 19.6 厘米，穗粗 4.7 厘米，秃尖长 0.1 厘米，穗行数 15.0 行，行粒数 34.2 粒，黄白粒白轴，鲜百粒重 38.5 克，出籽率 65.1%。倒伏率 0.0%，倒折率 0.0%。两年田间调查抗纹枯病、感大斑病、抗小斑病、抗南方锈病、抗茎腐病、抗粗缩病；两年人工接菌鉴定感纹枯病、高感大斑病、高感小斑病、感南方锈病、中抗腐霉茎腐病。品质分析：皮渣率 8.55%，可溶性总糖 15.88%，还原糖 2.43%。外观及品尝鉴定 89.5 分。

产量表现：2023 年参加福建省“闽鲜玉”科企联合体区域试验，鲜果穗平均亩产 993.0 千克，比对照粤甜 16 号减产 11.4%。2024 年续试，鲜果穗平均亩产 967.4 千克，比对照闽双色 6 号减产 8.4%。两年平均鲜果穗亩产 980.2 千克，比对照（粤甜 16 号、闽双色 6 号）减产 9.9%。

栽培技术要点：适时播种，春播 3 月中旬至 4 月中旬。与其它玉米采取空间或时间隔离，防止串粉。亩种植密度 3000～3500 株。春播多雨注意排水。施足基肥，基肥以有机肥为主，并亩施氮磷钾复合肥 30～35 千克，酸性土壤宜增施土壤调节剂；拔节期结合中耕培土增施尿素 10 千克、复合肥 15 千克；大喇叭口期后增施尿素 10 千克、复合肥 10 千克；开花前后增施钾肥，亩用量 10 千克。注意防治纹枯病、大斑病、小斑病、南方锈病、玉米螟等病虫害。适时采收，一般在授粉后 20 天左右采收。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：闽双甜 887 符合福建省鲜食玉米品种审定标准，通过审定。适宜福建省种植。

43、审定编号：闽审玉 20253002

品种名称：雪甜 199

申请单位：福州金苗种业有限公司

选育单位：福州金苗种业有限公司

品种来源：20QW × DS199

特征特性：属鲜食甜玉米品种。春播出苗至采收 73.9 天，2023

年比对照粤甜 16 号早熟 6.6 天，2024 年比对照闽双色 6 号早熟 5.4 天。幼苗叶鞘绿色，叶片绿色，花药绿色，颖壳绿色，花丝绿色。株型半紧凑，平均株高 165.9 厘米，穗位高 32.1 厘米，果穗长筒型，穗长 18.2 厘米，穗粗 4.7 厘米，秃尖长 0.5 厘米，穗行数 16.1 行，行粒数 35.5 粒，白粒白轴，鲜百粒重 34.4 克，出籽率 66.9%。倒伏率 0.0%，倒折率 0.0%。两年田间调查中抗纹枯病、中抗大斑病、抗小斑病、中抗南方锈病、抗茎腐病、抗粗缩病；两年人工接菌鉴定感纹枯病、感大斑病、中抗小斑病、中抗南方锈病、中抗腐霉茎腐病。品质分析：皮渣率 9.45%，可溶性总糖 15.63%，还原糖 4.50%。外观及品尝鉴定 89.2 分。

产量表现：2023 年参加福建省“闽鲜玉”科企联合体区域试验，鲜果穗平均亩产 992.5 千克，比对照粤甜 16 号减产 11.4%。2024 年续试，鲜果穗平均亩产 976.7 千克，比对照闽双色 6 号减产 7.5%。两年平均鲜果穗亩产 984.6 千克，比对照（粤甜 16 号、闽双色 6 号）减产 9.5%。

栽培技术要点：适时播种，春播 2 月下旬至 3 月下旬，秋播 8 月上旬至 9 月中旬（高海拔山区 8 月初完成播种）。与其它玉米采取空间或时间隔离，防止串粉。亩种植密度 3000~3300 株。春播多雨注意排水。施足基肥，基肥以有机肥为主，并亩施氮磷钾复合肥 30~35 千克，酸性土壤应增施土壤调节剂；拔节期结合中耕培土增施尿素 10 千克、复合肥 15 千克；大喇叭口期后增施尿素 10 千克、复合肥 10 千克；开花前后增施钾肥，亩用量 10 千

克。注意防治纹枯病、大斑病、玉米螟、草地贪夜蛾等病虫害。适时采收，一般在授粉后 20 天左右采收。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：雪甜 199 符合福建省鲜食玉米品种审定标准，通过审定。适宜福建省种植。

44、审定编号：闽审玉 20253003

品种名称：圣甜翡月

申请单位：圣尼斯种子（北京）有限公司

选育单位：圣尼斯种子（北京）有限公司、圣尼斯蔬菜种子有限公司

品种来源：SHY817-PS13-6505-04 × SYW-6SSLM804

特征特性：属鲜食甜玉米品种。春播出苗至鲜穗采收 73.2 天，2023 年比对照粤甜 16 号早熟 7.5 天，2024 年比对照闽双色 6 号早熟 5.9 天。幼苗叶鞘绿色，叶片绿色，花药绿色，颖壳绿色，花丝绿色。株型半紧凑，平均株高 172.6 厘米，穗位高 36.7 米，果穗长筒型，穗长 18.7 厘米，穗粗 4.7 厘米，秃尖长 0.1 厘米，穗行数 15.3 行，行粒数 33.8 粒，黄白粒白轴，鲜百粒重 38.5 克，出籽率 69.2%。倒伏率 0%，倒折率 0%。两年田间调查抗纹枯病、中抗大斑病、抗小斑病、抗南方锈病、抗茎腐病、中抗粗缩病；两年人工接菌鉴定高感纹枯病、感大斑病、感小斑病、感南方锈病、感腐霉茎腐病。品质分析：皮渣率 10.13%，可溶性总糖 16.43%，还原糖 2.62%。外观及品尝鉴定 88.1 分。

产量表现：2023 年参加福建省“闽鲜玉”科企联合体区域试验，鲜果穗平均亩产 1004.7 千克，比对照粤甜 16 号减产 10.3%。2024 年续试，鲜果穗平均亩产 974.5 千克，比对照闽双色 6 号减产 7.7%。两年平均鲜果穗亩产 989.6 千克，比对照（粤甜 16 号、闽双色 6 号）减产 9.1%。

栽培技术要点：适时播种，春播 3 月中旬至 4 月中旬。与其它玉米采取空间或时间隔离，防止串粉。亩种植密度 3000~3200 株。春播多雨注意排水。施足基肥，基肥以有机肥为主，并亩施氮磷钾复合肥 30~35 千克，酸性土壤宜增施土壤调节剂；拔节期结合中耕培土增施尿素 10 千克、复合肥 15 千克；大喇叭口期后增施尿素 10 千克、复合肥 10 千克；开花前后增施钾肥，亩用量 10 千克。注意防治纹枯病、大斑病、小斑病、南方锈病、茎腐病、玉米螟等病虫害。适时采收，一般在授粉后 20 天左右采收。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：圣甜翡月符合福建省鲜食玉米品种审定标准，通过审定。适宜福建省种植。

三、大豆

45、审定编号：闽审豆 20251001

品种名称：华夏 11

申请单位：华南农业大学

选育单位：华南农业大学

品种来源：华夏 3 号/粤夏 114

特征特性：属夏大豆普通型品种。夏播出苗至成熟 96.1 天，比对照华夏 10 号早熟 1.5 天。株型收敛，有限结荚习性，叶椭圆形，幼茎绿色，花白色，茸毛棕色，荚熟色褐色，籽粒椭圆，脐褐色，子叶黄色，种皮黄色且具微光泽。平均株高 57.9 厘米，主茎节数 13.3 个，单株有效分枝 4.7 个，有效荚数 53.6 个，单株粒数 114.8 粒，每荚粒数 2.2 粒，单株粒重 19.6 克，百粒重 18.9 克。接菌鉴定表现抗炭疽病、中感花叶病毒病 15 号株系、中抗花叶病毒病 18 号株系。品质检测：粗蛋白含量为 42.62%，粗脂肪含量为 17.41%。

产量表现：2022 年参加福建省夏大豆新品种区域试验，平均亩产量为 184.5 千克，比对照华夏 10 号增产 2.8%，增产不显著；2023 年续试，平均亩产量为 183.1 千克，比对照华夏 10 号增产 10.6%，增产极显著。两年平均亩产量为 183.8 千克，比对照华夏 10 号增产 6.5%。2024 年生产试验，平均亩产量为 178.4 千克，比对照华夏 10 号增产 3.8%。

栽培技术要点：适时播种，一般 6 月中下旬至 7 月下旬播种。合理密植，亩种植密度 1.4~1.6 万株，低肥力地块适当增加密度。施足基肥，基肥以农家肥为主，根据土壤肥力水平，中等肥力地块亩配施三元复合肥 5~10 千克，低肥力地块亩配施尿素 5~6 千克、重过磷酸钙 30~40 千克、硫酸钾 40 千克。加强田间管理，预防病虫、草、鼠害。成熟后及时收获。

省主要农作物品种审定委员会审定意见：华夏 11 符合福建省大豆品种审定标准，通过审定。适宜福建省夏播种植。

附件3

福建省撤销审定主要农作物品种目录（第十一批）

序号	作物	品种名称	审定编号	选育单位
1	水稻	8706	闽审稻1991G01（三明）	三明市农科所
2	水稻	汕优399	闽审稻1991G02（三明）	三明市农科所
3	水稻	金早14	闽审稻1991G03（三明）	福建农学院
4	水稻	威优40	闽审稻1991G04（三明）	湖南省郴州地区农科所
5	水稻	陆青早1号	闽审稻1991G05（三明）	广东省农科院水稻所
6	水稻	福优晚三	闽审稻20000004	福建省稻麦研究所、武平县种子公司
7	水稻	特优175	闽审稻20000009	福建省农科院稻麦所、南平市农科所
8	水稻	特优420	闽审稻20000011	宁德地区农科所
9	水稻	II 优明86	闽审稻2001009	三明市农科所
10	水稻	特优73	闽审稻2001010	福建省三明市农科所
11	水稻	特优158	闽审稻2001F02（龙岩）、 闽审稻2001013	福建省龙岩市农科所
12	水稻	D奇宝优1号	闽审稻2002003	尤溪县良种生化研究所、福建省种子总站
13	水稻	T优5537	闽审稻2002004	福建农林大学作物学院、福建省种子总站
14	水稻	II 优辐819	闽审稻2003003	南平市农科所
15	水稻	D优151	闽审稻2003006	尤溪县良种生化研究所、福建省种子总站

序号	作物	品种名称	审定编号	选育单位
16	水稻	金优明100	闽审稻2004001	福建省三明市农业科学研究所
17	水稻	II 优航1号	闽审稻2004003	福建省农科院稻麦研究所
18	水稻	II 优183	闽审稻2004004	南平市农科所
19	水稻	II 优1273	闽审稻2004006	福建省三明市农业科学研究所
20	水稻	特优671	闽审稻2004007	福建省宁德市农科所等
21	水稻	T优551	闽审稻2004010	福建农林大学作物学院、福建省种子总站
22	水稻	谷优527	闽审稻2004013	福建省农业科学院稻麦研究所
23	水稻	华优桂99	闽审稻2004E02 (漳州)	龙海市种子管理站
24	水稻	T优7882	闽审稻2004F02 (龙岩)	福建农大作物学院、龙岩市种子站
25	水稻	金优07	闽审稻2005001	福建省三明市农业科学研究所
26	水稻	金优2155	闽审稻2005002	福建省三明市农业科学研究所
27	水稻	金两优33	闽审稻2005009	福建农林大学作物科学院
28	水稻	特优627	闽审稻2005010	宁德市农科所
29	水稻	冈优527	闽审稻2005011	福建省尤溪县良种生化研究所、福建省种子总站
30	水稻	II 优131	闽审稻2005015	泉州市农业科学研究所
31	水稻	协优527	闽审稻2005G02 (三明)	尤溪县良种生化研究所
32	水稻	T78优07	闽审稻2006002	三明市农科所

序号	作物	品种名称	审定编号	选育单位
33	水稻	金山优3182	闽审稻2006003	福建农林大学作物学院
34	水稻	泸优1256	闽审稻2006010	南平市农科所
35	水稻	泸优5648	闽审稻2006015	南平市农科所
36	水稻	Ⅱ优航2号	闽审稻2006017	福建省农科院水稻所
37	水稻	I 特优3381	闽审稻2006023	龙岩市农科所
38	水稻	Ⅱ优1698	闽审稻2006H03(南平)	南平市种子管理站、南平市农科所
39	水稻	金两优4号	闽审稻2007001	福建农林大学作物科学学院
40	水稻	金优1398	闽审稻2007004	福建省三明市农业科学研究所
41	水稻	Ⅱ优明118	闽审稻2007006	福建省三明市农业科学研究所
42	水稻	两优3773	闽审稻2007009	福建省农业科学院水稻研究所
43	水稻	T55优627	闽审稻2007012	宁德市农业科学研究所
44	水稻	乐优94	闽审稻2007017	福建省农业科学院水稻研究所
45	水稻	宜优99	闽审稻2007018	四川省眉山市裕丰种业有限责任公司育种研究院
46	水稻	宜优1659	闽审稻2007023	福建省南平市农业科学研究所
47	水稻	特优航2号	闽审稻2007026	福建省农业科学院水稻研究所
48	水稻	两优3156	闽审稻2008005	福建省农业科学院水稻研究所
49	水稻	绿香313	闽审稻2008008	四川省农科院水稻高粱研究所、四川省绿丹种业有限责任公司

序号	作物	品种名称	审定编号	选育单位
50	水稻	e II 优315	闽审稻2008012	福建农林大学作物遗传育种研究所
51	水稻	特优369	闽审稻2008H02 (南平)	福建省建阳春天种业有限公司
52	水稻	金优028	闽审稻2009001	福建省南平市农业科学研究所
53	水稻	谷优2329	闽审稻2009002	福建农林大学作物学院
54	水稻	广优明118	闽审稻2009005	福建省三明市农业科学研究所
55	水稻	谷优929	闽审稻2009G01 (三明)	福建省三明市农业科学研究所
56	水稻	圣优369	闽审稻2009H02 (南平)	建阳春天种业有限公司
57	水稻	金农2优3号	闽审稻2010005	福建农林大学作物科学学院
58	水稻	谷优769	闽审稻2010007	福建省南平市农业科学研究所、福建省农业科学院水稻研究所
59	水稻	江优明62	闽审稻2010009	福建省三明市农业科学研究所、江西省农业科学院水稻研究所、福建六三种业有限责任公司
60	水稻	花2优86 (原名花 优286)	闽审稻2010A01 (福州)	福建农林大学作物科学学院、福州市种子管理站
61	水稻	谷优16	闽审稻2010F02 (龙岩)	龙岩龙津作物品种研究所、福建省农业科学院水稻研究所
62	水稻	圣优108	闽审稻2010H01 (南平)	福建省建阳春天种业有限公司
63	水稻	天优2155	闽审稻2011001	福建省三明市农业科学研究所、福建六三种业有限责任公司、广东省农业科学院水稻研究所
64	水稻	全优3301	闽审稻2011003	福建省农业科学院生物技术研究所、福建省农业科学院水稻研究所

序号	作物	品种名称	审定编号	选育单位
65	水稻	赣优明占	闽审稻2011004	福建省三明市农业科学院水稻研究所、福建省农业科学院水稻研究所、江西省农业科学院水稻研究所、福建六三种业有限责任公司
66	水稻	天优596	闽审稻2011005	福建省南平市农业科学研究所、广东省农业科学院水稻研究所
67	水稻	谷优1186	闽审稻2011006	福建农林大学作物科学学院、福建省农业科学院水稻研究所
68	水稻	元丰优86	闽审稻2011009	福建省三明市农业科学研究所、福建六三种业有限责任公司
69	水稻	金优966	闽审稻2011A01（福州）	福州农丰源种业有限公司、福州市种子管理站
70	水稻	川优561	闽审稻2011A02（福州）	福建省农业科学院水稻研究所
71	水稻	台粳8号	闽审稻2011B01（莆田）	莆田市种子管理站
72	水稻	福龙两优863	闽审稻2011F01（龙岩）	龙岩市农业科学研究所
73	水稻	谷优2173	闽审稻2011G01（三明）	福建省农业科学院水稻研究所、福建福稻种业科技有限公司
74	水稻	红优2155	闽审稻2012001	福建万佳禾种业有限公司、西南科技大学水稻研究所、福建省三明市农业科学研究所
75	水稻	福两优1587	闽审稻2012005	福建兴禾种业科技有限公司、福建农林大学作物遗传育种研究所
76	水稻	金农3优3号	闽审稻2012006	福建农林大学作物科学学院
77	水稻	广优3186	闽审稻2012007	福建农林大学作物科学学院、福建省三明市农业科学研究所
78	水稻	花2优3301	闽审稻2012009	福建农林大学作物科学学院、福建省农业科学院生物技术研究所
79	水稻	深优9775	闽审稻2012010	中种集团福建农嘉种业有限公司
80	水稻	中新优1586	闽审稻2012012	福建兴禾种业科技有限公司

序号	作物	品种名称	审定编号	选育单位
81	水稻	泰丰优2098	闽审稻2012013	福建省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所
82	水稻	元丰优7008	闽审稻2012A01 (福州)	福建省农业科学院水稻研究所
83	水稻	全优2689	闽审稻2012F01 (龙岩)	福建农林大学作物科学学院、福建省农业科学院水稻研究所
84	水稻	钱优916	闽审稻2012G01 (三明)	福建农乐种业有限公司科技研究所
85	水稻	嘉优99	闽审稻2012H01 (南平)	浙江省嘉兴市农业科学研究院 (所)、浙江大学原子核农业科学研究所、福州纳科农作物育种研究所
86	水稻	金山优70	闽审稻2012H02 (南平)	福建农林大学作物科学学院、福州纳科农作物育种研究所
87	水稻	深优866	闽审稻2012H03 (南平)	江西中种赣农种业有限公司
88	水稻	夷优186 (区试名: 香丰优186)	闽审稻2013001	福建六三种业有限公司、福建省南平市农业科学研究所、福建科力种业有限公司
89	水稻	谷优353	闽审稻2013002	宁德市农业科学研究所、福建省农科院水稻研究所
90	水稻	钰优180	闽审稻2013003	福建省南平市农业科学研究所、福建科力种业有限公司
91	水稻	嘉浙优99	闽审稻2013005	福建金山都发展有限公司
92	水稻	泰丰优656	闽审稻2013008	福建省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所
93	水稻	民优5338	闽审稻2014002	福建省农业科学院水稻研究所
94	水稻	京福8优77	闽审稻2014003	福建省农业科学院水稻研究所、福建亚丰种业有限公司
95	水稻	全优1093	闽审稻2014004	福建省农业科学院水稻研究所
96	水稻	福两优2155	闽审稻2014005	福建旺穗种业有限公司

序号	作物	品种名称	审定编号	选育单位
97	水稻	M优2155 (区试名: M优2055)	闽审稻2014006	福建农林大学作物科学学院、三明市农业科学研究院
98	水稻	夷优266 (区试名: 香丰优266)	闽审稻2014007	福建禾丰种业有限公司
99	水稻	赣优810	闽审稻2014008	福建省农业科学院水稻研究所、江西省农业科学院水稻研究所
100	水稻	广优673	闽审稻2014010	中种集团福建农嘉种业股份有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、三明市农业科学研究院
101	水稻	桐优039 (区试名: 泉9优039)	闽审稻2014011	泉州市农业科学研究所、福建神农大丰种业科技有限公司
102	水稻	广两优676 (区试名: 两优676)	闽审稻2014012	福建兴禾种业科技有限公司、福建省农业科学院水稻研究所
103	水稻	聚两优636 (区试名: 粤两优636)	闽审稻2014013	福建省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所
104	水稻	聚两优673 (区试名: 粤两优673)	闽审稻2014014	中种集团福建农嘉种业股份有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所
105	水稻	花优218 (区试名: 花2优136)	闽审稻2014015	福建农林大学作物科学学院
106	水稻	花2优315	闽审稻2014016	福建农林大学作物科学学院、福建亚丰种业有限公司
107	水稻	福龙两优29	闽审稻2014017	龙岩市农业科学研究所、中国种子集团有限公司三亚分公司
108	水稻	钱优3301	闽审稻2014019	福建省农业科学院生物技术研究所、浙江省农业科学院作物与核技术应用研究所

序号	作物	品种名称	审定编号	选育单位
109	水稻	天优25	闽审稻2014E01（漳州）	漳州市农业科学研究所、漳州市种子管理站、广东省农业科学院水稻研究所
110	水稻	泰优676（区试名：泰丰优676）	闽审稻2014E03（漳州）	福建省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所
111	水稻	圣优996	闽审稻2014H01（南平）	福建科力种业有限公司、福建省南平市农业科学研究所
112	水稻	夷优180（区试名：香丰优180）	闽审稻2014H02（南平）	福建省南平市农业科学研究所
113	水稻	Y两优676	闽审稻2015002	福建兴禾种业有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、湖南杂交水稻研究中心
114	水稻	元优919	闽审稻2015007	福建亚丰种业有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、福建省三明市农业科学院
115	水稻	福龙两优1031	闽审稻2015009	龙岩市农业科学研究所、中国种子集团有限公司三亚分公司
116	水稻	广8优673	闽审稻2015011	中国种子集团有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所、中种集团福建农嘉种业股份有限公司
117	水稻	深优9789	闽审稻2015019	漳浦县种子管理站、漳州市种子管理站
118	水稻	内香8518	闽审稻2015020	龙海市种子管理站
119	水稻	K两优369（区试名：两优369）	闽审稻2015022	福建丰田种业有限公司

