

附件 1

2026 年福建省初审通过主要农作物品种信息表

序号	作物种类	品种名称	品种来源	试验渠道	申请单位	选育单位	适宜种植范围	选育人员
1	水稻	明祥优 1690	明祥 A × 明恢 1690	统一试验	福建六三种业有限责任公司	福建六三种业有限责任公司、三明市农业科学研究院	福建省莆田市、泉州市、厦门市、漳州市、龙岩市作早稻种植	唐江霞、杨旺兴、林成豹、黄宇晴、邓则勤、卓伟、林志坚、邹文广、黄显波、许旭明
2	水稻	闽早优 32	闽早 A × 福恢 32	统一试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所	福建省稻瘟病轻发区作早稻种植	陈秋实、陈荣、郑长林、吴志源、杨东、田斌、陈文捷
3	水稻	庆优 9703	庆源 A × 福恢 9703	统一试验	福建金品农业科技股份有限公司	福建省农业科学院水稻研究所、福建金品农业科技股份有限公司	福建省莆田市、泉州市、厦门市、漳州市、龙岩市作早稻种植	张以华、蔡巨广、董敬铿、李佳静、黄进武、游年顺、胡荣华、陈红英、黄珊
4	水稻	明太优 1690	明太 A × 明恢 1690	统一试验	三明市农业科学研究院	江苏中江种业股份有限公司、三明市农业科学研究院、福建六三种业有限责任公司	福建省稻瘟病轻发区作早稻种植	林成豹、杨旺兴、黄显波、邹文广、陆建康、陈家银、唐江霞、卓伟、邓则勤、许旭明、梅佳、查军民、雷伏贵、刘洪顺、段誉昌
5	水稻	榕夏两优 519	榕夏 S × 泉恢 519	统一试验	泉州市农业科学研究所	泉州市农业科学研究所、福建省农业科学院水稻研究所	福建省作中稻种植	陈惠清、侯凯强、余文昌、谢旺有、周鹏、谢少和、陈锦文、王天生、胡荣华、郑菲艳
6	水稻	福两优 3196	福祥 3S × 福恢 2196	统一试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所	福建省作中稻种植	潘德灼、赵明富、方珊茹、沈伟锋、侯志敏、刘玉芹、郑吉焕、赵志民、熊雪娇

序号	作物种类	品种名称	品种来源	试验渠道	申请单位	选育单位	适宜种植范围	选育人员
7	水稻	妍两优6915	妍S×福恢6915	统一试验	福建丰田种业有限公司	福建省农业科学院水稻研究所、福建丰田种业有限公司	福建省作中稻种植	涂诗航、胡荣华、郑菲艳、杨官畅、葛小平、周鹏、洪永河、郑轶、郑家团、杨生河
8	水稻	君两优910	君S×南恢910	统一试验	福建省南平市农业科学研究所	福建省南平市农业科学研究所、福建君和生物科技有限公司、武夷山科力兴种业有限公司	福建省作中稻种植	马妙明、邱慧明、张振斌、周仕全、谢冬容、彭吕清、王怀富、石良文、江文清、饶溶晖
9	水稻	禾两优香占	禾9S×闽华香占	统一试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所、福建农林大学农学院、福建禾丰种业股份有限公司	福建省作晚稻种植	杨东、陈志伟、郑长林、官华忠、陈秋实、毛大梅、陈俊长、章清杞
10	水稻	景两优165	景8S×佳禾165	统一试验	厦门大学生命科学学院	厦门大学生命科学学院	福建省作晚稻种植	郑景生、江良荣、黄荣裕、张海、崔玉超、黄育民
11	水稻	明太优7258	明太A×福恢7258	统一试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所、三明市农业科学研究所	福建省作晚稻种植	王洪飞、杨旺兴、房贤涛、邹文广、罗曦、卓伟、陈春霞、董瑞霞、游晴如、黄庭旭
12	水稻	玥糯两优335	玥糯S×福糯335	统一试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所	福建省作晚稻种植	郑长林、陈秋实、陈荣、吴志源、田斌、杨东、陈文捷
13	水稻	东联红9号	丰美占/本地品种红米晚	统一试验	南安市码头东联农业科技示范场	南安市码头东联农业科技示范场	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	林玉云、张毅明、王智卿、张玉珍、方桂花、张联财、李继志、王丹妮、黄建平、张益民
14	水稻	榕夏两优039	榕夏S×泉恢039	联合体试验	泉州市农业科学研究所	泉州市农业科学研究所、福建省农业科学院水稻研究所	福建省稻瘟病轻发区作中稻种植	余文昌、陈锦文、谢旺有、谢少和、周鹏、侯凯强、陈惠清、王天生、涂诗航
15	水稻	榕香优2196	榕香A×福恢2196	联合体试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所	福建省作中稻种植	方珊珊、沈伟锋、潘德灼、侯志敏、赵明富、刘玉芹、郑吉焕

序号	作物种类	品种名称	品种来源	试验渠道	申请单位	选育单位	适宜种植范围	选育人员
16	水稻	瓚两优 6915	瓚 S × 福恢 6915	联合体试验	厦门大学生命科学学院	厦门大学生命科学学院、福建省农业科学院水稻研究所	福建省作中稻种植	欧阳鑫昊、涂诗航、黄荣裕、周鹏、邱蕾蕾、郑菲艳、洪永河、胡荣华、葛小平、郑家团
17	水稻	君优 912	君 A × 南恢 912	联合体试验	福建省南平市农业科学研究所	福建省南平市农业科学研究所、福建君和生物科技有限公司、武夷山科力兴种业有限公司	福建省稻瘟病轻发区作中稻种植	张振斌、邱慧明、马妙明、周仕全、刘端华、王怀富、石良文、彭吕清、江文清、饶溶晖
18	水稻	福兴优 418	福兴 A × 南恢 418	联合体试验	福建省南平市农业科学研究所	福建省南平市农业科学研究所、福建农林大学作物遗传改良研究所	福建省稻瘟病轻发区作中稻种植	邱慧明、章清杞、马妙明、毛大梅、张振斌、官华忠、谢冬容、陈志伟、周仕全、石良文、彭吕清、王怀富、饶溶晖
19	水稻	山两优 638	山 S × 南恢 638	联合体试验	福建省南平市农业科学研究所	福建省南平市农业科学研究所、三明市农业科学研究院	福建省作中稻种植	周仕全、黄显波、邱慧明、林成豹、张振斌、邓则勤、刘端华、唐江霞、马妙明、彭吕清、石良文、饶溶晖、王怀富
20	水稻	福兴优 627	福兴 A × 亚恢 627	联合体试验	宁德市农业科学研究所	宁德市农业科学研究所、福建农林大学农学院	福建省作中稻种植	陈若平、潘明、吴国灿、毛大梅、汤凯毅、官华忠、林毓乐、陈志伟、程云铃、李想、詹丹、雷丽丽、刘萍花、王雄荣
21	水稻	沐两优 1311	沐 S × 亚恢 1311	联合体试验	福建亚丰种业有限公司	福建亚丰种业有限公司	福建省稻瘟病轻发区作中稻种植	丁信良、廖留英、丁源、林霖、丁德豪、黄智明
22	水稻	智谷优 633	智谷 A × 荟恢 633	联合体试验	福建闽诚农业发展有限公司	福建闽诚农业发展有限公司、科荟种业股份有限公司、福建省农业科学院生物技术研究所	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	王锋、陈邓峰、王志超、黄青、陈建民、罗炜强、宋辉、顾建强、杨凤仙
23	水稻	华浙优 606	华浙 6A × R1006	联合体试验	中国水稻研究所	中国水稻研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司	福建省作晚稻种植	童汉华、唐昌华、张鹏、侯凡、钟铮铮

序号	作物种类	品种名称	品种来源	试验渠道	申请单位	选育单位	适宜种植范围	选育人员
24	水稻	福泰优67	福泰 1A × JR67	联合体试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所	福建省作晚稻种植	潘德灼、沈伟锋、方珊茹、侯志敏、赵明富、刘玉芹、郑吉焕
25	水稻	明芎优209	明芎 A × 明恢209	联合体试验	三明市农业科学研究院	三明市农业科学研究院	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	邓则勤、林成豹、唐江霞、黄显波、林志坚
26	水稻	浙杭优332	浙杭 K2A × 金恢 332	联合体试验	金华市农业科学研究院	金华市农业科学研究院、杭州种业集团有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、杭州利丰种业科学研究院有限公司	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	卞晓波、李新敏、徐晶晶、陈晓阳、纪昊、薛占奎、吴侯、祝丽娟
27	水稻	厦两优7228	厦禾 7S × 佳恢228	联合体试验	厦门大学生命科学学院	厦门大学生命科学学院	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	黄荣裕、江良荣、郑景生、欧阳鑫昊、崔玉超、钟新斌、吴银旺、邱蕾蕾、黄育民
28	水稻	永瑞优448	永瑞 A × 东南恢 448	联合体试验	永富农业科技有限公司	永富农业科技有限公司、福建省农业科学院水稻研究所	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	郑向华、陈永发、程朝平、叶宁、叶新福
29	水稻	泸优3202	泸香 618A × 明恢 3202	联合体试验	三明市农业科学研究院	三明市农业科学研究院、四川省农业科学院水稻高粱研究所（四川省农业科学院德阳分院）	福建省作晚稻种植	韦新宇、张涛、肖长春、蒋开锋、黄建鸿、曹应江、曾跃辉、秦俭、杨尚霖
30	水稻	莱两优273	莱 01S × 荟恢273	联合体试验	科荟种业股份有限公司	科荟种业股份有限公司、福建省农业科学院生物技术研究所	福建省作晚稻种植	王锋、陈建民、王志超、罗炜强、温怀常、宋辉、周敏
31	水稻	永晶优506	永晶 A × 东南恢 506	联合体试验	永富农业科技有限公司	永富农业科技有限公司、福建省农业科学院水稻研究所	福建省作晚稻种植	程朝平、陈永发、郑向华、叶宁、叶新福
32	水稻	吉优 151	吉丰 A × 江恢151	联合体试验	福建丰田种业有限公司	福建丰田种业有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	侯志敏、杨官畅、沈伟锋、方珊茹、潘德灼、熊雪娇、赵明富、刘玉芹、郑吉焕、杨生河

序号	作物种类	品种名称	品种来源	试验渠道	申请单位	选育单位	适宜种植范围	选育人员
33	水稻	福兴优1560	福兴A×金恢1560	联合体试验	福建农林大学农学院	福建农林大学农学院	福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植	毛大梅、章清杞、林芳、潘明、潘润森、夏法刚、陈志伟、唐定中、周元昌
34	水稻	山两优5111	山S×泉恢5111	联合体试验	泉州市农业科学研究所	泉州市农业科学研究所、三明市农业科学研究院	福建省作晚稻种植	侯凯强、林成豹、余文昌、黄显波、陈惠清、邓则勤、陈锦文、唐江霞、谢旺有、谢少和、王天生、王智卿
35	水稻	特优9816	龙特甫A×JR816	联合体试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所	福建省作晚稻种植	方珊茹、赵明富、沈伟锋、潘德灼、侯志敏、刘玉芹、郑吉焕、赵志民、熊雪娇
36	水稻	锦两优丝苗	锦S×乌山丝苗	联合体试验	福建农林大学	福建农林大学	福建省作晚稻种植	官华忠、陈志伟、毛大梅、潘润森、章清杞、夏法刚
37	水稻	品香优808	品香A×福恢808	自主试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所、四川省农业科学院水稻高粱研究所（四川省农业科学院德阳分院）	福建省作中稻种植	董瑞霞、张涛、王洪飞、曹应江、周鹏、秦俭、房贤涛、陈春霞、游晴如、黄庭旭
38	水稻	青香优808	青香A×福恢808	自主试验	福建省农业科学院水稻研究所	福建省农业科学院水稻研究所、广东鲜美种苗股份有限公司	福建省作中稻种植	陈春霞、林青山、周鹏、房贤涛、董瑞霞、王洪飞、罗曦、罗立新、游晴如、黄庭旭
39	玉米	闽甜糯535	闽糯系WF19×闽甜系S149	统一试验	福建省农业科学院作物研究所	福建省农业科学院作物研究所	福建省作鲜食玉米种植	许静、林建新、廖长见、张扬、庄炜、詹鹏麟、许孚、卢和顶、陈山虎
40	玉米	福宝甜糯223	闽糯系WF19×闽甜系S223	统一试验	福建省农业科学院作物研究所	福建省农业科学院作物研究所、福州立信种苗有限公司	福建省作鲜食玉米种植	詹鹏麟、林建新、廖长见、张扬、庄炜、许静、许孚、卢和顶、陈山虎、林伟银、冯子楠
41	玉米	闽双色9号	闽甜系AS67×12hi307	联合体试验	福建省农业科学院作物研究所	福建省农业科学院作物研究所、浙江省农业科学院	福建省作鲜食玉米种植	廖长见、吕桂华、卢和顶、王婷甄、张扬、陈山虎、林建新

序号	作物种类	品种名称	品种来源	试验渠道	申请单位	选育单位	适宜种植范围	选育人员
42	玉米	浙甜1902	GN5×17hi264	联合体试验	浙江省农业科学院	浙江省农业科学院	福建省作鲜食玉米种植	吕桂华、吴振兴、陈坚剑、郭国锦、王婷甄、李方剑
43	大豆	闽豆17	沪选26-19/浙鲜5号	统一试验	福建省农业科学院作物研究所	福建省农业科学院作物研究所	福建省作鲜食大豆春播种植	张玉梅、蓝新隆、陆佩兰、陈松亮、林国强、陈其俊
44	大豆	福夏豆9号	南农10-1/南农99-6	统一试验	福建省农业科学院作物研究所、南京农业大学	福建省农业科学院作物研究所、南京农业大学	福建省夏播种植	张玉梅、杨永彬、丁文涛、蓝新隆、林珊珊、陈松亮、赵晋铭、郭娜、林国强、邢邯
45	大豆	华夏45	华夏3号/桂夏豆2号	统一试验	华南农业大学	华南农业大学	福建省夏播种植	程艳波、年海、王应祥、马启彬、蔡占东、连腾祥、李新岗、胡江宇、吴多可、姜亚迪、李宗亚、汪怀闽

附件 2

2026 年福建省初审通过主要农作物品种简介与 审定意见

一、水稻

1. 品种名称：明祥优 1690

申请者：福建六三种业有限责任公司

育种者：福建六三种业有限责任公司、三明市农业科学研究院

品种来源：明祥 A × 明恢 1690

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作早稻种植，平均全生育期 128.0 天，比对照 T78 优 2155 迟熟 1.7 天。平均株高 93.8 厘米，穗长 21.8 厘米，每亩有效穗数 18.3 万穗，每穗总粒数 160.1 粒，结实率 78.1%，千粒重 24.4 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.9、2.2，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 80.6%，整精米率 58.8%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.0，垩白度 1.6%，透明度 2 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 84 毫米，直链淀粉含量 14.3%。米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建省早稻迟熟组区域试验，平均亩产 546.7 千克，比对照 T78 优 2155 增产 3.6%；2024 年续试，平均亩产 494.4 千克，比对照 T78 优 2155 增产 4.2%；两年区域试验平均亩产

520.5 千克，比对照增产 3.9%；2025 年生产试验，平均亩产 548.9 千克，比对照潢优 308 增产 8.6%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作早稻种植，一般 2 月下旬 3 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×20.0 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，需肥中等，施足基肥，中后期严控偏施氮肥。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治白叶枯病、南方黑条矮缩病、螟虫、稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：明祥优 1690 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省莆田市、泉州市、厦门市、漳州市、龙岩市作早稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

2. 品种名称：闽早优 32

申请者：福建省农业科学院水稻研究所

育种者：福建省农业科学院水稻研究所

品种来源：闽早 A×福恢 32

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作早稻种植，平均全生育期 126.2 天，比对照 T78 优 2155 早熟 0.1 天。平均株高 93.7 厘米，穗长 22.4 厘米，每亩有效穗数 19.0 万穗，每穗总粒数 143.7

粒，结实率 83.6%，千粒重 26.0 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.7、3.0，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 81.1%，整精米率 59.2%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.1，垩白度 2.7%，透明度 2 级，碱消值 5.2 级，胶稠度 85 毫米，直链淀粉含量 13.1%。米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建省早稻迟熟组区域试验，平均亩产 548.7 千克，比对照 T78 优 2155 增产 4.0%；2024 年续试，平均亩产 493.0 千克，比对照 T78 优 2155 增产 4.0%；两年区域试验平均亩产 520.8 千克，比对照增产 4.0%；2025 年生产试验，平均亩产 524.7 千克，比对照潢优 308 增产 3.9%。

栽培技术要点：在福建省作早稻种植，一般 2 月下旬到 3 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×20.0 厘米，每蔸插 2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，亩施纯氮 10~12 千克，适当加大钾肥用量。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治稻瘟病、白叶枯病、稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：闽早优 32 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省稻瘟病轻发区作早稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

3. 品种名称：庆优 9703

申请者：福建金品农业科技股份有限公司

育种者：福建省农业科学院水稻研究所、福建金品农业科技股份有限公司

品种来源：庆源 A × 福恢 9703

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作早稻种植，平均全生育期 128.1 天，比对照 T78 优 2155 迟熟 1.8 天。平均株高 104.3 厘米，穗长 22.8 厘米，每亩有效穗数 19.0 万穗，每穗总粒数 134.9 粒，结实率 85.2%，千粒重 28.3 克。稻瘟病综合指数两年分别为 3.0、2.2，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感白背稻飞虱。米质主要指标：糙米率 78.2%，整精米率 54.8%，粒长 7.4 毫米，长宽比 3.3，垩白度 3.5%，透明度 2 级，碱消值 5.1 级，胶稠度 78 毫米，直链淀粉含量 13.3%。米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建省早稻组区域试验，平均亩产 560.9 千克，比对照 T78 优 2155 增产 4.7%；2024 年续试，平均亩产 500.0 千克，比对照 T78 优 2155 增产 2.2%；两年区域试验平均亩产 530.4 千克，比对照 T78 优 2155 增产 3.4%；2025 年生产试验，平均亩产 536.7 千克，比对照滇优 308 增产 6.3%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作早稻种植，一般 2 月下旬 3 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1 ~ 1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米 × 23.1 厘米，每蔸插 2 ~ 3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，重施基

肥，适量追肥，重视穗粒肥施用。常规水分管理，收割前7~10天断水。④病虫害防治。重点防治纹枯病、白叶枯病、稻飞虱、稻纵卷叶螟等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：庆优9703符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省莆田市、泉州市、厦门市、漳州市、龙岩市作早稻种植。经投票，同意14票，不同意0票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

4. 品种名称：明太优1690

申请者：三明市农业科学研究院

育种者：江苏中江种业股份有限公司、三明市农业科学研究院、福建六三种业有限责任公司

品种来源：明太A×明恢1690

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作早稻种植，平均全生育期127.1天，比对照T78优2155迟熟0.5天。平均株高95.8厘米，穗长21.8厘米，每亩有效穗数19.3万穗，每穗总粒数153.9粒，结实率81.3%，千粒重24.8克。稻瘟病综合指数两年分别为2.9、2.6，穗颈瘟损失率最高级5级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感白背飞虱。米质主要指标：糙米率79.8%，整精米率58.0%，粒长7.0毫米，长宽比3.2，垩白度2.5%，透明度1级，碱消值6.0级，胶稠度78毫米，直链淀粉含量16.0%。米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023年参加福建省早稻组区域试验，平均亩产567.0千克，比对照T78优2155增产7.4%；2024年续试，平均亩产510.2千克，比对照T78优2155增产4.2%；两年区域试验平均亩产538.6千克，比对照增产5.8%；2025年生产试验，平均亩产538.2千克，比对照潢优308增产6.6%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作早稻种植，一般2月下旬3月上旬播种，秧田播种量每亩10千克，大田亩用种量1~1.25千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄5.5叶左右，秧龄控制在30天以内。栽插株行距20.0厘米×23.1厘米，每蔸插2~3粒谷秧，每亩插足基本苗6万以上。③水肥管理。科学施肥，需肥中等，施足基肥，早施追肥，中后期严控偏施氮肥。常规水分管理，收割前7~10天断水。④病虫害防治。重点防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、螟虫、白背飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：明太优1690符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省稻瘟病轻发区作早稻种植。经投票，同意14票，不同意0票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

5. 品种名称：榕夏两优519

申请者：泉州市农业科学研究所

育种者：泉州市农业科学研究所、福建省农业科学院水稻研究所

品种来源：榕夏S×泉恢519

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 134.1 天，2022 年比对照 II 优 3301 早熟 2.9 天、2023 年比对照禾两优 676 早熟 4.6 天。平均株高 111.1 厘米，穗长 25.1 厘米，每亩有效穗数 16.3 万穗，每穗总粒数 184.8 粒，结实率 85.7%，千粒重 26.8 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.5、2.3，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 80.8%，整精米率 67.3%，粒长 7.3 毫米，长宽比 3.5，垩白度 0.9%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 76 毫米，直链淀粉含量 17.8%。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加福建省中稻组区域试验，平均亩产 633.1 千克，比对照 II 优 3301 减产 0.7%；2023 年续试，平均亩产 636.5 千克，比对照禾两优 676 增产 0.3%；两年区域试验平均亩产 634.8 千克，比对照（II 优 3301、禾两优 676）减产 0.2%；2024 年生产试验，平均亩产 599.9 千克，比对照禾两优 676 增产 0.4%。

栽培技术要点：①在福建省作中稻种植，一般 4 月中下旬 5 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20 厘米×23 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③科学施肥，亩施纯氮 12 公斤，氮、磷、钾比例为 1:0.6:0.8，基肥、分蘖肥、穗肥、粒肥比例 5:3:1:1。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④重点防治白叶枯病、二化螟、稻纵卷叶螟及稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：榕夏两优 519 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作中稻种植。经投

票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

6. 品种名称：福两优 3196

申请者：福建省农业科学院水稻研究所

育种者：福建省农业科学院水稻研究所

品种来源：福祥 3S × 福恢 2196

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 138.8 天，比对照禾两优 676 迟熟 2.3 天。平均株高 116.9 厘米，穗长 23.5 厘米，每亩有效穗数 18.4 万穗，每穗总粒数 168.4 粒，结实率 79.5%，千粒重 26.7 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.9、3.0，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 80.3%，整精米率 55.7%，粒长 7.5 毫米，长宽比 3.6，垩白度 1.3%，透明度 2 级，碱消值 6.2 级，胶稠度 80 毫米，直链淀粉含量 14.7%。米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建省中稻组区域试验，平均亩产 639.4 千克，比对照禾两优 676 增产 0.7%；2024 年续试，平均亩产 591.0 千克，比对照禾两优 676 减产 1.0%；两年区域试验平均亩产 615.2 千克，比对照减产 0.2%；2025 年生产试验，平均亩产 607.0 千克，比对照禾两优 676 减产 0.2%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作中稻种植，一般 4 月下旬至 5 月中旬播种，秧田播种量每亩 15 千克，大田亩用种量

1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米×23.1 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，早施分蘖肥，亩施纯氮 12 千克，氮、磷、钾比例 1:0.7:0.9 为宜。常规水管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治白叶枯病、稻飞虱和螟虫等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见:福两优 3196 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作中稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

7. 品种名称: 妍两优 6915

申请者: 福建丰田种业有限公司

育种者: 福建省农业科学院水稻研究所、福建丰田种业有限公司

品种来源: 妍 S×福恢 6915

特征特性: 属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 138.9 天，比对照禾两优 676 迟熟 1.8 天。平均株高 125.8 厘米，穗长 25.0 厘米，每亩有效穗数 16.0 万穗，每穗总粒数 202.7 粒，结实率 82.0%，千粒重 26.6 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.6、2.5，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 81.7%，整精米率 60.4%，粒长 7.3 毫米，长宽比 3.3，垩白度 0.9%，透明度 1 级，碱消值 5.2 级，胶稠度 73

毫米，直链淀粉含量 18.3%。米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建省中稻组区域试验，平均亩产 654.4 千克，比对照禾两优 676 增产 3.2%；2024 年续试，平均亩产 622.5 千克，比对照禾两优 676 增产 2.3%；两年区域试验平均亩产 638.4 千克，比对照增产 2.8%；2025 年生产试验，平均亩产 592.1 千克，比对照禾两优 676 增产 3.2%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作中稻种植，一般 4 月下旬至 5 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1.25~1.5 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20 厘米×25 厘米，每蔸插 1~2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，在施足基肥的基础上，应早施分蘖肥，适施穗肥和粒肥，适当加大钾肥用量。亩施纯氮 12~14 千克，氮磷钾比例为 1:0.4:1。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治白叶枯病、稻飞虱、稻纵卷叶螟等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：妍两优 6915 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作中稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

8. 品种名称：君两优 910

申请者：福建省南平市农业科学研究所

育种者：福建省南平市农业科学研究所、福建君和生物科技有限公司、武夷山科力兴种业有限公司

品种来源：君 S × 南恢 910

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 137.5 天，比对照禾两优 676 早熟 1.5 天。平均株高 119.6 厘米，穗长 23.5 厘米，每亩有效穗数 15.3 万穗，每穗总粒数 209.7 粒，结实率 85.4%，千粒重 24.7 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.4、2.3，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 81.2%，整精米率 64.0%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.2，垩白度 0.9%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 64 毫米，直链淀粉含量 17.1%。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。。

产量表现：2023 年参加福建省中稻组区域试验，平均亩产 605.6 千克，比对照禾两优 676 减产 2.6%；2024 年续试，平均亩产 598.2 千克，比对照禾两优 676 减产 1.5%；两年区试平均亩产 601.9 千克，比对照禾两优 676 减产 2.1%；2025 年生产试验，平均亩产 636.0 千克，比对照禾两优 676 增产 5.4%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作中稻种植，一般 4 月下旬至 5 月下旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.5 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 23.1 厘米 × 23.1 厘米，每蔸插 1~2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，每亩施纯氮 10 公斤，氮磷钾比为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7~

10 天断水。④病虫害防治。重点防治白叶枯病、螟虫、褐飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：君两优 910 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作中稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

9. 品种名称：禾两优香占

申请者：福建省农业科学院水稻研究所

育种者：福建省农业科学院水稻研究所、福建农林大学农学院、福建禾丰种业股份有限公司

品种来源：禾 9S × 闽华香占

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 121.8 天，比对照宜优 673 早熟 1.7 天。平均株高 102.1 厘米，穗长 23.6 厘米，每亩有效穗数 17.5 万穗，每穗总粒数 156.7 粒，结实率 84.0%，千粒重 24.0 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.6、2.7，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；抗白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 80.6%，整精米率 60.4%，粒长 6.9 毫米，长宽比 3.3，垩白度 0.6%，透明度 1 级，碱消值 5.2 级，胶稠度 81 毫米，直链淀粉含量 15.3%。米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建省晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 495.6 千克，比对照宜优 673 增产 3.5%；2024 年续试，平均亩产 522.3 千克，比对照宜优 673 增产 4.0%；两年区域试验平均亩产 508.9 千克，

比对照增产 3.7%；2025 年生产试验，平均亩产 554.1 千克，比对照宜优 673 增产 2.6%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般 6 月中旬至 7 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×20.0 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。在施足基肥的基础上，应早施分蘖肥，适施穗肥和粒肥，适当加大钾肥用量。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治稻飞虱、螟虫等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：禾两优香占符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作晚稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

10. 品种名称：景两优 165

申请者：厦门大学生命科学学院

育种者：厦门大学生命科学学院

品种来源：景 8S×佳禾 165

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 121.2 天，比对照宜优 673 早熟 1.9 天。平均株高 112.2 厘米，穗长 25.4 厘米，每亩有效穗数 15.8 万穗，每穗总粒数 180.8 粒，结实率 85.1%，千粒重 23.8 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.8、2.7，

穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 80.9%，整精米率 64.8%，粒长 6.9 毫米，长宽比 3.3，垩白度 1%，透明度 1 级，碱消值 6.8 级，胶稠度 71 毫米，直链淀粉含量 15.3%。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建省晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 487.6 千克，比对照宜优 673 增产 1.8%；2024 年续试，平均亩产 526.2 千克，比对照宜优 673 增产 2.6%；两年区域试验平均亩产 506.9 千克，比对照增产 2.2%；2025 年生产试验，平均亩产 552.3 千克，比对照宜优 673 增产 2.3%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般 6 月中旬~7 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米×23.1 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，重施基肥，早施追肥，巧施穗肥，增施磷钾肥，亩施纯氮 10~12 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治纹枯病、白叶枯病、细条病、螟虫、稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：景两优 165 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作晚稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

11. 品种名称：明太优 7258

申请者：福建省农业科学院水稻研究所

育种者：福建省农业科学院水稻研究所、三明市农业科学研究所

品种来源：明太 A × 福恢 7258

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 120.9 天，比对照宜优 673 早熟 0.8 天。平均株高 108.7 厘米，穗长 23.9 厘米，每亩有效穗数 18.4 万穗，每穗总粒数 155.6 粒，结实率 77.7%，千粒重 26.6 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.6、1.7，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 83%，整精米率 59.6%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.7，垩白度 0.6%，透明度 1 级，碱消值 6.8 级，胶稠度 72 毫米，直链淀粉含量 14.0%。。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2024 年参加福建省晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 518.3 千克，比对照宜优 673 增产 3.2%；2025 年续试，平均亩产 536.1 千克，比对照宜优 673 增产 5.5%；两年区域试验平均亩产 527.2 千克，比对照增产 4.3%；2025 年生产试验，平均亩产 548.5 千克，比对照宜优 673 增产 2.1%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般 6 月上旬至 6 月中旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 20.0 厘米 × 23.3 厘米，每蔸插 2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，重施基

肥，早施分蘖肥，配施有机肥及磷、钾肥，亩施纯氮 10 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治白叶枯病、稻曲病、纹枯病、稻飞虱、螟虫等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见:明太优 7258 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作晚稻种植。经投票，同意 13 票，不同意 1 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

12. 品种名称: 玥糯两优 335

申请者: 福建省农业科学院水稻研究所

育种者: 福建省农业科学院水稻研究所

品种来源: 玥糯 S × 福糯 335

特征特性: 属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 119.0 天，比对照宜优 673 早熟 1.3 天。平均株高 101.8 厘米，穗长 23.1 厘米，每亩有效穗数 17.2 万穗，每穗总粒数 171.0 粒，结实率 77.5%，千粒重 23.2 克。稻瘟病综合指数两年分别为 3.6、2.4，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 81.7%，整精米率 69.5%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.0，阴糯米率 1%，白度 1 级，碱消值 6.4 级，胶稠度 100 毫米，直链淀粉含量 0.7%。米质达部颁一等优质食用糯稻品种品质标准。

产量表现: 2024 年参加福建省晚稻特种稻组区域试验，平均亩产 494.3 千克，比对照宜优 673 减产 1.1%；2025 年续试，平均亩产 501.4

千克，比对照宜优 673 增产 4.3 %；两年区域试验平均亩产 497.8 千克，比对照增产 1.6%。

栽培技术要点：在福建省作晚稻种植，一般 6 月上旬播种，秧田播种量每亩 15 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×20.0 厘米，每蔸插 2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。科学施肥，稳施基肥、早施分蘖肥，适当加大钾肥用量。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。重点防治白叶枯病、稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见： 玥糯两优 335 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作晚稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

13.品种名称：东联红 9 号

申请者：南安市码头东联农业科技示范场

育种者：南安市码头东联农业科技示范场

品种来源：丰美占/本地品种红米晚

特征特性：属籼型常规水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 120.8 天，比对照宜优 673 迟熟 0.6 天。平均株高 119.2 厘米，穗长 25.7 厘米，每亩有效穗数 15.3 万穗，每穗总粒数 216.4 粒，结实率 84.0%，千粒重 21.2 克。稻瘟病综合指数两年分别为 4.5、2.8，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 81.8%，整精米率 66.3%，粒长 6.3

毫米，长宽比 3.1，垩白度 0.4%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 68 毫米，直链淀粉含量 13.5%。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。糙米棕红色。

产量表现：2024 年参加福建省晚稻特种稻组区域试验，平均亩产 509.6 千克，比对照宜优 673 增产 2.0%；2025 年续试，平均亩产 536.1 千克，比对照宜优 673 增产 11.5%；两年区域试验平均亩产 522.88 千克，比对照增产 6.73%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般 6 月下旬~7 月上旬播种，秧田播种量每亩 20~25 千克，大田亩用种量 2.5~3.0 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5 叶左右，秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 16.7 厘米×23.1 厘米，每蔸插 3~4 粒谷秧，每亩插足基本苗 8 万以上。③水肥管理。科学施肥，科学施肥，施足基肥，早施分蘖肥。亩施纯氮 10 千克，氮磷钾比例为 1:0.5:0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。预防为主，综合防治，适时用药，严控关键期病虫害危害，重点防治白叶枯病、稻瘟病、稻飞虱、螟虫等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：东联红 9 号符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

14. 品种名称：榕夏两优 039

申请者：泉州市农业科学研究所

育种者：泉州市农业科学研究所、福建省农业科学院水稻研究所

品种来源：榕夏 S × 泉恢 039

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 137.1 天，比对照禾两优 676 早熟 1.0 天。平均株高 120.8 厘米，穗长 26.4 厘米，每亩有效穗数 17.7 万穗，每穗总粒数 224.4 粒，结实率 81.8%，千粒重 25.8 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.4、3.0，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 80.8%，整精米率 66.3%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.3，垩白度 1.6%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 74 毫米，直链淀粉含量 15.6%。米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建翔丰科企联合体中稻组区试，平均亩产 659.5 千克，比对照禾两优 676 减产 0.3%；2024 年续试，参加福建丰源科企联合体中稻 A 组区试，平均亩产 720.1 千克，比对照禾两优 676 增产 5.8%；两年区域试验平均亩产 689.8 千克，比对照增产 2.8%；2025 年生产试验，平均亩产 657.0 千克，比对照禾两优 676 增产 5.2%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作中稻种植，一般 4 月下旬 5 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1 ~ 1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米 × 23.1 厘米，每蔸插 2 ~ 3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，施足基肥，早施追肥，亩施纯氮 12 千克，氮、磷、钾比例为 1:0.5:0.8。常

规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治稻瘟病、白叶枯病、稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：榕夏两优 039 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省稻瘟病轻发区作中稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

15. 品种名称：榕香优 2196

申请者：福建省农业科学院水稻研究所

育种者：福建省农业科学院水稻研究所

品种来源：榕香 A × 福恢 2196

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 138.9 天，比对照禾两优 676 迟熟 0.6 天。平均株高 122.0 厘米，穗长 24.0 厘米，每亩有效穗数 19.7 万穗，每穗总粒数 195.2 粒，结实率 81.8%，千粒重 25.7 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.6、3.5，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；抗白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 80.1%，整精米率 62.2%，粒长 7.5 毫米，长宽比 3.8，垩白度 0.4%，透明度 2 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 74 毫米，直链淀粉含量 15.9%。米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建丰源科企水稻品种试验联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 634.3 千克，比对照禾两优 676 增产 3.4%；2024 年续试，平均亩产 687.7 千克，比对照禾两优 676 增产 3.2%；两

年区域试验平均亩产 661.0 千克,比对照增产 3.3%;2025 年生产试验,平均亩产 656.2 千克,比对照禾两优 676 增产 4.0%。

栽培技术要点: ①播种时间与播种量。在福建省作中稻种植,一般 4 月下旬至 5 月中旬播种,秧田播种量每亩 15 千克,大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右,秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米×23.1 厘米,每蔸插 2~3 粒谷秧,每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥,早施分蘖肥,亩施纯氮 12 千克,氮、磷、钾比例 1:0.7:0.9 为宜。常规水管理,收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治稻飞虱和螟虫等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见: 榕香优 2196 符合福建省水稻品种审定标准,适宜在福建省作中稻种植。经投票,同意 14 票,不同意 0 票,通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

16. 品种名称: 瓚两优 6915

申请者: 厦门大学生命科学学院

育种者: 厦门大学生命科学学院、福建省农业科学院水稻研究所

品种来源: 瓚 S×福恢 6915

特征特性: 属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植,平均全生育期 138.5 天,比对照禾两优 676 迟熟 0.5 天。平均株高 120.3 厘米,穗长 26.5 厘米,每亩有效穗数 19.3 万穗,每穗总粒数 222.6

粒，结实率 79.7%，千粒重 24.3 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.1、2.6，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；中抗白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 80.3%，整精米率 66.7%，粒长 7.5 米，长宽比 3.3，垩白度 1.5%，透明度 1 级，碱消值 5.2 级，胶稠度 80 毫米，直链淀粉含量 17.6%。米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建翔丰科企联合体中稻组区域试验，平均亩产 656.0 千克，比对照禾两优 676 减产 0.9%；2024 年参加福建丰源科企联合体中稻 A 组区域试验，平均亩产 708.3 千克，比对照禾两优 676 增产 4.1%；两年区域试验平均亩产 682.1 千克，比对照增产 1.6%；2025 年生产试验，平均亩产 664.3 千克，比对照天优华占增产 4.5%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作中稻种植，一般 4 月下旬~5 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 23.1 厘米×23.1 厘米，每蔸插 2 粒谷秧，每亩插足基本苗 5 万以上。③水肥管理。科学施肥，重施基肥，早施追肥，巧施穗肥，增施磷钾肥，亩施纯氮 10~12 千克，氮磷钾比例为 1: 0.6: 0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治纹枯病、细条病、螟虫、稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：瓚两优 6915 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作中稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种

审定委员会主任委员会予以审核。

17. 品种名称: 君优 912

申请者: 福建省南平市农业科学研究所

育种者: 福建省南平市农业科学研究所、福建君和生物科技有限公司、武夷山科力兴种业有限公司

品种来源: 君 A × 南恢 912

特征特性: 属籼型三系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 130.5 天，比对照禾两优 676 早熟 5.2 天。平均株高 117.3 厘米，穗长 22.8 厘米，每亩有效穗数 17.9 万穗，每穗总粒数 186.2 粒，结实率 80.3%，千粒重 24.9 克。稻瘟病综合指数两年分别为 3.19、2.05，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 81.5%，整精米率 59.3%，粒长 6.9 毫米，长宽比 3.1，垩白度 0.4%，透明度 1 级，碱消值 6.1，胶稠度 74 毫米，直链淀粉 18.0%。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。。

产量表现: 2023 年参加福建省金泰科企水稻联合体中稻组区域试验，平均亩产 648.7 千克，比对照禾两优 676 增产 0.8%；2024 年续试，平均亩产 605.1 千克，比对照禾两优 676 增产 1.5%；两年区试平均亩产 626.9 千克，比对照禾两优 676 增产 1.1%；2025 年生产试验，平均亩产 626.9 千克，比对照禾两优 676 增产 1.7%。

栽培技术要点: ①播种时间与播种量。在福建省作中稻种植，一般 4 月下旬 5 月下旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.5 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧

龄控制在 30 天以内。栽插株行距 23.1 厘米 × 23.1 厘米，每蔸插 1~2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，每亩施纯氮 10 公斤，氮磷钾比为 1:0.6:0.9。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治稻瘟病、白叶枯病、螟虫、褐飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：君优 912 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省稻瘟病轻发区作中稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

18. 品种名称：福兴优 418

申请者：福建省南平市农业科学研究所

育种者：福建省南平市农业科学研究所、福建农林大学作物遗传改良研究所

品种来源：福兴 A × 南恢 418

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 132.5 天，比对照禾两优 676 早熟 2.7 天。平均株高 121.6 厘米，穗长 25.1 厘米，每亩有效穗数 15.3 万穗，每穗总粒数 198.0 粒，结实率 77.8%，千粒重 27.9 克。稻瘟病综合指数两年分别为 3.6、2.6，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 81.2%，整精米率 54.7%，粒长 7.2 毫米，长宽比 3.0，垩白度 0.6%，透明度 2 级，碱消值 5.3，胶稠度 82 毫米，直链淀粉 19.2%。米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现: 2023 年参加福建省金泰科企水稻联合体中稻组区域试验, 平均亩产 653.8 千克, 比对照禾两优 676 增产 2.3%; 2024 年续试, 平均亩产 636.1 千克, 比对照禾两优 676 增产 4.0%; 两年区试平均亩产 645.0 千克, 比对照禾两优 676 增产 3.2%; 2025 年生产试验, 平均亩产为 623.6 公斤, 比对照禾两优 676 增产 1.7%。

栽培技术要点: ①播种时间与播种量。在福建省作中稻种植, 一般 4 月下旬 5 月下旬播种, 秧田播种量每亩 10 千克, 大田亩用种量 1~1.5 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右, 秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 23.1 厘米 × 23.1 厘米, 每蔸插 1~2 粒谷秧, 每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥, 每亩施纯氮 10 公斤, 氮磷钾比为 1:0.6:0.8。常规水管理, 收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治稻瘟病、白叶枯病、螟虫、褐飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见: 福兴优 418 符合福建省水稻品种审定标准, 适宜在福建省稻瘟病轻发区作中稻种植。经投票, 同意 14 票, 不同意 0 票, 通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

19. 品种名称: 山两优 638

申请者: 福建省南平市农业科学研究所

育种者: 福建省南平市农业科学研究所、三明市农业科学研究所

品种来源: 山 S × 南恢 638

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 132.6 天，比对照禾两优 676 早熟 3.2 天。平均株高 122.1 厘米，穗长 23.9 厘米，每亩有效穗数 16.7 万穗，每穗总粒数 169.4 粒，结实率 85.1%，千粒重 26.6 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.3、2.4，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 81.9%，整精米率 68.0%，粒长 7.2 毫米，长宽比 3.2，垩白度 0.3%，透明度 1 级，碱消值 5.5，胶稠度 79 毫米，直链淀粉 17.0%。米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建省金泰科企水稻联合体中稻组区域试验，平均亩产 639.6 千克，比对照禾两优 676 减产 0.7%；2024 年续试，平均亩产 630.0 千克，比对照禾两优 676 增产 5.7%；两年区试平均亩产 634.8 千克，比对照禾两优 676 增产 2.5%；2025 年生产试验，平均亩产 633.7 千克，比对照禾两优 676 增产 2.4%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作中稻种植，一般 4 月下旬 5 月下旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.5 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 23.1 厘米×26.4 厘米，每蔸插 1~2 粒谷秧，每亩插足基本苗 5 万以上。③水肥管理。科学施肥，每亩施纯氮 11 公斤，氮磷钾比为 1:0.6:0.9。常规水管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治白叶枯病、螟虫、褐飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：山两优 638 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作中稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种

审定委员会主任委员会予以审核。

20. 品种名称：福兴优 627

申请者：宁德市农业科学研究所

育种者：宁德市农业科学研究所、福建农林大学农学院

品种来源：福兴 A × 亚恢 627

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 131.6 天，比对照禾两优 676 早熟 3.1 天。平均株高 118.5 厘米，穗长 24.2 厘米，每亩有效穗数 17.7 万穗，每穗总粒数 151.8 粒，结实率 81.6%，千粒重 29.2 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.4、2.6，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 81.6%，整精米率 58.8%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.1，垩白度 1.2%，透明度 1 级，碱消值 6.4 级，胶稠度 81 毫米，直链淀粉含量 17.3%。米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建省金泰科企水稻品种试验联合体中稻组区域试验，平均亩产 624.5 千克，比对照禾两优 676 减产 2.3%；2024 年续试，平均亩产 602.7 千克，比对照禾两优 676 减产 1.4%；两年区域试验平均亩产 613.6 千克，比对照减产 1.9%；2025 年生产试验，平均亩产 612.9 千克，比对照禾两优 676 增产 2.7%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作中稻种植，一般 5 月上旬播种，秧田播种量每亩 12.5~15 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧

龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20 厘米 × 23 厘米，每蔸插 2 ~ 3 粒谷秧，每亩插足基本苗 4 万以上。③水肥管理。科学施肥，亩施氮肥 10-12 千克，氮、磷、钾施用比例为 1: 0. 5: 0. 7。常规水分管理，收割前 7 ~ 10 天断水。④病虫害防治。重点防治纹枯病、白叶枯病、稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：福兴优 627 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作中稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

21. 品种名称：沐两优 1311

申请者：福建亚丰种业有限公司

育种者：福建亚丰种业有限公司

品种来源：沐 S × 亚恢 1311

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 133.1 天，比对照禾两优 676 早熟 2.7 天。平均株高 128.6 厘米，穗长 25.6 厘米，每亩有效穗数 15.1 万穗，每穗总粒数 166.3 粒，结实率 84.3%，千粒重 31.5 克。稻瘟病综合指数两年分别为 3.88、3.3，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 82.8%，整精米率 62.9%，粒长 7.9 毫米，长宽比 3.3，垩白度 0.7%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 74 毫米，直链淀粉含量 16.5%。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。香味分 79 分，符合 NY/T596-2002《香稻米》香味标准。

产量表现: 2023 年参加福建金泰科企水稻品种试验联合体中稻组区域试验, 平均亩产 649.7 千克, 比对照禾两优 676 增产 0.9%; 2024 年续试, 平均亩产 618.7 千克, 比对照禾两优 676 增产 3.8%; 两年区域试验平均亩产 634.2 千克, 比对照增产 2.4%; 2025 年生产试验, 平均亩产 619.7 千克, 比对照禾两优 676 增产 0.6%。

栽培技术要点: ①播种时间与播种量。在福建省作中稻种植, 一般 4 月下旬至 5 月中旬播种, 秧田播种量每亩 10 千克, 大田亩用种量 1.0~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右, 秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米×23.3 厘米, 每蔸插 1~2 粒谷秧, 每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥, 施足基肥, 早施追肥, 增施钾肥, 适量追施穗肥。亩施纯氮 12~15 千克, 氮磷钾比例为 1:0.5:1.0。常规水分管理, 收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治稻瘟病、白叶枯病、螟虫、稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见: 沐两优 1311 符合福建省水稻品种审定标准, 适宜在福建省稻瘟病轻发区作中稻种植。经投票, 同意 14 票, 不同意 0 票, 通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

22. 品种名称: 智谷优 633

申请者: 福建闽诚农业发展有限公司

育种者: 福建闽诚农业发展有限公司、科荟种业股份有限公司、福建省农业科学院生物技术研究所

品种来源：智谷 A × 荟恢 633

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 118.7 天，比对照天优华占早熟 1.1 天。平均株高 114.0 厘米，穗长 25.9 厘米，每亩有效穗数 17.5 万穗，每穗总粒数 181.2 粒，结实率 82.6%，千粒重 24.7 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.38、3.3，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 81.9%，整精米率 61.0%，粒长 7.4 毫米，长宽比 3.6，垩白度 0.5%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 64 毫米，直链淀粉含量 18.2%。米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加科荟种业优质稻品种试验联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 597.45 千克，比对照天优华占增产 3.8%；2024 年参加福建省金泰科企水稻品种试验联合体晚稻中熟组续试，平均亩产 536.8 千克，比对照天优华占增产 0.6%；两年区域试验平均亩产 567.1 千克，比对照增产 2.2%；2025 年生产试验，平均亩产 574.1 千克，比对照天优华占增产 4.8%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般 6 月下旬 ~ 7 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1.0 ~ 1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米 × 23.1 厘米，每蔸插 2 ~ 3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，施足基肥，早施追肥，配施有机肥及磷、钾肥，每亩施纯氮 10 ~ 12 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7 ~ 10 天断水。④病虫害防治。重点防治稻瘟病、纹枯病、白叶枯病、稻飞虱等

病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：智谷优 633 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

23. 品种名称：华浙优 606

申请者：中国水稻研究所

育种者：中国水稻研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司

品种来源：华浙 6A × R1006

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 120.2 天，比对照天优华占早熟 1.1 天。平均株高 106.6 厘米，穗长 25.0 厘米，每亩有效穗数 17.4 万穗，每穗总粒数 201.5 粒，结实率 86.3%，千粒重 24.0 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.4、3.1，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 81.4%，整精米率 61.0%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.5，垩白度 1.9%，透明度 1 级，碱消值 5.7 级，胶稠度 76 毫米，直链淀粉含量 14.1%。米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建闽佳科企联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 581.2 千克，比对照天优华占增产 3.9%；2024 年参加福建丰源科企联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 562.8 千克，比对照天优华占增产 1.5%；两年区域试验平均亩产 572.0 千克，比对照增产 2.7%；2025 年生产试验，平均亩产 572.2 千克，比对照天优华占

增产 6.7%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般 6 月下旬至 7 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1.0~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米×23.1 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，早施追肥，巧施穗肥，亩施纯氮 10~12 千克，氮、磷、钾比例为 1:0.8:0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治白叶枯病、稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：华浙优 606 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作晚稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

24. 品种名称：福泰优 67

申请者：福建省农业科学院水稻研究所

育种者：福建省农业科学院水稻研究所

品种来源：福泰 1A×JR67

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 123.7 天，比对照天优华占迟熟 2.4 天。平均株高 108.5 厘米，穗长 25.0 厘米，每亩有效穗数 18.3 万穗，每穗总粒数 184.6 粒，结实率 80.8%，千粒重 25.4 克。稻瘟病综合指数两年分别为 3.0、3.4，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；中抗白叶枯病；高感稻飞虱。

米质主要指标：糙米率 80.4%，整精米率 60.6%，粒长 7.6 毫米，长宽比 3.8，垩白度 0.3%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 68 毫米，直链淀粉含量 16.7%。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建闽佳科企联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 573.3 千克，比对照天优华占增产 2.5%；2024 年参加福建丰源科企水稻品种试验联合体续试，平均亩产 574.6 千克，比对照天优华占增产 3.6%；两年区域试验平均亩产 573.9 千克，比对照增产 3.1%；2025 年生产试验，平均亩产 571.0 千克，比对照天优华占增产 4.1%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般 5 月下旬至 6 月中旬播种，秧田播种量每亩 15 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 16.7 厘米×23.1 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，早施分蘖肥，亩施纯氮 12 千克，氮、磷、钾比例 1:0.5:0.8 为宜。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治稻飞虱、螟虫等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：福泰优 67 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作晚稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

25. 品种名称：明芎优 209

申请者：三明市农业科学研究院

育种者：三明市农业科学研究院

品种来源：明芎 A × 明恢 209

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 122.3 天，比对照天优华占迟熟 2.6 天。平均株高 107.9 厘米，穗长 23.7 厘米，每亩有效穗数 17.9 万穗，每穗总粒数 167.0 粒，结实率 81.9%，千粒重 24.5 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.56、2.75，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 82.2%，整精米率 67.4%，粒长 7.5 毫米，长宽比 3.6，垩白度 0.0%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 72 毫米，直链淀粉含量 16.7%。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建省金泰科企水稻品种试验联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 528.5 千克，比对照天优华占减产 2.6%；2024 年续试，平均亩产 530.2 千克，比对照天优华占减产 2.6%；两年区域试验平均亩产 529.4 千克，比对照减产 2.6%；2025 年生产试验，平均亩产 575.2 千克，比对照天优华占增产 5.0%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般 6 月上旬 7 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.0 叶左右，秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 20.0 厘米 × 23.0 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，需肥中等，施足基肥，早施追肥，中后期严控偏施氮肥。常规水分管理，收

割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、螟虫和稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：明芎优 209 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

26. 品种名称：浙杭优 332

申请者：金华市农业科学研究院

育种者：金华市农业科学研究院、杭州种业集团有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、杭州利丰种业科学研究院有限公司

品种来源：浙杭 K2A × 金恢 332

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 117.0 天，比对照天优华占早熟 4.3 天。平均株高 102.3 厘米，穗长 23.2 厘米，每亩有效穗数 15.7 万穗，每穗总粒数 227.7 粒，结实率 84.5%，千粒重 24.7 克。稻瘟病综合指数两年分别为 3.9、3.4，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 83.1%，整精米率 56.7%，粒长 6.1 毫米，长宽比 2.5，垩白度 3%，透明度 1 级，碱消值 7 级，胶稠度 80 毫米，直链淀粉含量 15%。米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建闽佳科企联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 589.0 千克，比对照天优华占增产 5.3%；2024 年参加福

建丰源科企水稻品种试验联合体区域试验，平均亩产 572.1 千克，比对照天优华占增产 3.2%；两年区域试验平均亩产 580.6 千克，比对照增产 4.2%；2025 年生产试验，平均亩产 599.6 千克，比对照天优华占增产 9.3%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般 6 月上旬~7 月中旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米×23.1 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，重施底肥，早施追肥，每亩施纯氮 12 公斤，氮磷钾比例为 1:0.5:1。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治稻瘟病、白叶枯病、螟虫、褐飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：浙杭优 332 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

27. 品种名称：厦两优 7228

申请者：厦门大学生命科学学院

育种者：厦门大学生命科学学院

品种来源：厦禾 7S×佳恢 228

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 121.1 天，比对照天优华占迟熟 1.2 天。平均株高 110.1 厘

米，穗长 25.3 厘米，每亩有效穗数 18.4 万穗，每穗总粒数 204.4 粒，结实率 83.5%，千粒重 22.4 克。稻瘟病综合指数两年分别为 4.0、4.9，穗颈瘟损失率最高级 7 级，感稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 81.1%，整精米率 58.7%，粒长 7.5 米，长宽比 3.8，垩白度 0.1%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 70 毫米，直链淀粉含量 15.0%。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加科荟种业优质稻品种试验联合体区域试验，平均亩产 584.4 千克，比对照天优华占增产 1.6%；2024 年参加福建丰源科企联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 555.8 千克，比对照天优华占增产 0.3%；两年区域试验平均亩产 570.1 千克，比对照增产 0.9%；2025 年生产试验，平均亩产 564.3 千克，比对照天优华占增产 2.9%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般 6 月中旬~7 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 19.8 厘米×23.1 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，重施基肥，早施追肥，巧施穗肥，增施磷钾肥，亩施纯氮 10~12 千克，氮磷钾比例为 1: 0.6: 0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治稻瘟病、纹枯病、白叶枯病、细条病、螟虫、稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：厦两优 7228 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种

植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

28. 品种名称：永瑞优 448

申请者：永富农业科技有限公司

育种者：永富农业科技有限公司、福建省农业科学院水稻研究所

品种来源：永瑞 A × 东南恢 448

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 121.1 天，比对照天优华占迟熟 1.5 天。平均株高 108.6 厘米，穗长 27.0 厘米，每亩有效穗数 16.5 万穗，每穗总粒数 190.2 粒，结实率 80.9%，千粒重 24.1 克。稻瘟病综合指数两年分别为 3、3.2，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 82.0%，整精米率 59.8%，粒长 7.7 毫米，长宽比 3.9，垩白度 0.8%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 74 毫米，直链淀粉含量 17.3%。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建省金泰科企水稻联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 555.9 千克，比对照天优华占增产 2.5%；2024 年续试，平均亩产 529.0 千克，比对照天优华占减产 2.9%；两年区域试验平均亩产 542.4 千克，比对照减产 0.2%；2025 年生产试验，平均亩产 548.3 千克，比对照天优华占减产 0.9%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般 6 月中、下旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25

千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.0 叶左右，秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，需要平衡施肥，后期注重钾肥使用，亩施纯氮 10~12 千克，氮、磷、钾比例为 1:0.6:0.8。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治稻瘟病、白叶枯病和稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：永瑞优 448 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

29. 品种名称：泸优 3202

申请者：三明市农业科学研究院

育种者：三明市农业科学研究院、四川省农业科学院水稻高粱研究所（四川省农业科学院德阳分院）

品种来源：泸香 618A × 明恢 3202

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 121.1 天，比对照天优华占迟熟 2.5 天。平均株高 113.7 厘米，穗长 25.4 厘米，每亩有效穗数 17.7 万穗，每穗总粒数 171.1 粒，结实率 81.9%，千粒重 26.1 克。稻瘟病综合指数两年分别为 3.05、2.5，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 82.3%，整精米率 60.9%，粒长 7.4 毫米，长宽比 3.4，垩白度 0.3%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 60 毫米，

直链淀粉含量 19.2%。米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。

产量表现: 2024 年参加福建金泰科企水稻品种试验联合体晚稻中熟组区域试验, 平均亩产 560.9 千克, 比对照天优华占增产 4.3%; 2025 年续试, 平均亩产 544.4 千克, 比对照天优华占增产 3.3%; 两年区域试验平均亩产 552.7 千克, 比对照增产 3.8%; 2025 年生产试验, 平均亩产 568.0 千克, 比对照天优华占增产 4.5%。

栽培技术要点: ①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植, 一般 6 月上、中旬播种, 秧田播种量每亩 10 千克, 大田亩用种量 1~1.5 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右, 秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 18.0 厘米×20.0 厘米, 每蔸插 2~3 粒谷秧, 每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥, 每亩施纯氮 12.0 千克, 氮磷钾比为 1:0.8:0.8, 施足基肥, 早施追肥。常规水分管理, 收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治纹枯病、白叶枯病、螟虫、褐飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见: 沪优 3202 符合福建省水稻品种审定标准, 适宜在福建省作晚稻种植。经投票, 同意 14 票, 不同意 0 票, 通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

30. 品种名称: 莱两优 273

申请者: 科荟种业股份有限公司

育种者: 科荟种业股份有限公司、福建省农业科学院生物技术研究所

品种来源：茉 01S × 荟恢 273

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 119.6 天，比对照天优华占迟熟 0.1 天。平均株高 110.5 厘米，穗长 25.1 厘米，每亩有效穗数 17.0 万穗，每穗总粒数 182.5 粒，结实率 86.2%，千粒重 22.6 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.3、2.25，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 82.0%，整精米率 61.4%，粒长 7.4 毫米，长宽比 3.7，垩白度 0.7%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 66 毫米，直链淀粉含量 14.9%。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2024 年参加福建金泰科企水稻品种试验联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 535.1 千克，比对照天优华占增产 0.2%；2025 年续试，平均亩产 532.8 千克，比对照天优华占减产 2.6%；两年区域试验平均亩产 533.9 千克，比对照减产 1.2%；2025 年生产试验，平均亩产 567.9 千克，比对照天优华占增产 4.4%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般 6 月下旬 7 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 16.7 厘米 × 23.1 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，重施基肥，早施追肥，巧施穗肥，适当增施磷、钾肥。亩施纯氮 10 千克，氮磷钾比例为 1:0.6:0.8。常规水管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治纹枯病、白叶枯病、稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：茉两优 273

符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作晚稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

31. 品种名称：永晶优 506

申请者：永富农业科技有限公司

育种者：永富农业科技有限公司、福建省农业科学院水稻研究所

品种来源：永晶 A × 东南恢 506

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 122.2 天，比对照天优华占迟熟 2.7 天。平均株高 110.3 厘米，穗长 26.2 厘米，每亩有效穗数 17.5 万穗，每穗总粒数 187.6 粒，结实率 79.9%，千粒重 23.9 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.5、2.4，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 81.9%，整精米率 62.5%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.3，垩白度 0.5%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 73 毫米，直链淀粉含量 17.1%。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2024 年参加福建省金泰科企水稻联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 548.9 千克，比对照天优华占增产 2.8%；2025 年续试，平均亩产 562.6 千克，比对照天优华占增产 2.8%；两年区域试验平均亩产 555.7 千克，比对照增产 2.8%；2025 年生产试验，平均亩产 561.1 千克，比对照天优华占增产 3.4%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般6月中、下旬播种，秧田播种量每亩10千克，大田亩用种量1~1.25千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄5.0叶左右，秧龄控制在28天以内。栽插株行距20.0厘米×23.0厘米，每蔸插2~3粒谷秧，每亩插足基本苗6万以上。③水肥管理。科学施肥，需要平衡施肥，后期注重钾肥使用，亩施纯氮11~13千克，氮、磷、钾比例为1:0.8:0.8。常规水分管理，收割前7~10天断水。④病虫害防治。重点防治稻曲病、白叶枯病和稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：永晶优506符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作晚稻种植。经投票，同意14票，不同意0票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

32. 品种名称：吉优151

申请者：福建丰田种业有限公司

育种者：福建丰田种业有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所

品种来源：吉丰A×江恢151

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期120.5天，比对照天优华占迟熟1.3天。平均株高113.8厘米，穗长23.7厘米，每亩有效穗数18.0万穗，每穗总粒数158.4粒，结实率85.7%，千粒重29.8克。稻瘟病综合指数两年分别为3.2、3.8，穗颈瘟损失率最高级5级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。

米质主要指标：糙米率 83.2%，整精米率 37.4%，粒长 7.5 毫米，长宽比 3.2，垩白度 7.3%，透明度 1 级，碱消值 6 级，胶稠度 56 毫米，直链淀粉含量 25.3%，符合加工专用型水稻品种品质要求。

产量表现：2024 年参加福建丰源科企水稻品种试验联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 581.2 千克，比对照天优华占增产 4.8%；2025 年续试，平均亩产 630.6 千克，比对照天优华占增产 6.0%；两年区域试验平均亩产 605.9 千克，比对照增产 5.4%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般于 6 月中旬播种，秧田播种量每亩 15 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 20 厘米×25 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 5 万以上。③水肥管理。科学施肥，早施分蘖肥，亩施纯氮 12 千克，氮、磷、钾比例 1:0.5:0.8 为宜。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治稻瘟病、白叶枯病、稻飞虱和螟虫等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：吉优 151 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

33. 品种名称：福兴优 1560

申请者：福建农林大学农学院

育种者：福建农林大学农学院

品种来源：福兴 A × 金恢 1560

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 121.2 天，比对照宜优 673 早熟 3.5 天。平均株高 109.7 厘米，穗长 25.1 厘米，每亩有效穗数 18.5 万穗，每穗总粒数 169.1 粒，结实率 79.8%，千粒重 28.1 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.7、3.4，穗颈瘟损失率最高级 5 级，中感稻瘟病；高感白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 80.6%，整精米率 67.7%，粒长 7.2 毫米，长宽比 3.4，垩白度 0.1%，透明度 2 级，碱消值 5.2 级，胶稠度 82 毫米，直链淀粉含量 18.7%。米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2022 年参加福建省科研单位水稻品种试验联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 588.8 千克，比对照宜优 673 增产 6.9%；2023 年续试，平均亩产 544.1 千克，比对照宜优 673 增产 6.9%；两年区域试验平均亩产 566.4 千克，比对照增产 6.9%；2024 年生产试验，平均亩产 565.0 千克，比对照宜优 673 增产 5.2%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量：在福建省作晚稻种植，一般 6 月下旬 7 月上旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1 ~ 1.25 千克。②移栽时间与种植密度：水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20 厘米 × 20 厘米，每蔸插 2 ~ 3 粒谷秧，每亩插足基本苗 5 万以上。③水肥管理：科学施肥，亩施纯氮 10 公斤，氮、磷、钾比例为 1:0.8:0.8。常规水分管理，收割前 7 ~ 10 天断水。④病虫害防治：重点防治稻瘟病、白叶枯病和稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：福兴优 1560

符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

34. 品种名称：山两优 5111

申请者：泉州市农业科学研究所

育种者：泉州市农业科学研究所、三明市农业科学研究院

品种来源：山 S × 泉恢 5111

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 125.2 天，比对照宜优 673 迟熟 1.5 天。平均株高 112.9 厘米，穗长 23.2 厘米，每亩有效穗数 20.2 万穗，每穗总粒数 175.8 粒，结实率 80.6%，千粒重 25.2 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.6、2.3，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 81.6%，整精米率 67.5%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.3，垩白度 0.7%，透明度 1 级，碱消值 5 级，胶稠度 75 毫米，直链淀粉含量 15.1%。米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加福建省科研单位水稻试验联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 530.4 千克，比对照宜优 673 增产 0.4%；2024 年参加福建丰源科企联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 545.7 千克，比对照宜优 673 增产 5.2%；两年区域试验平均亩产 538.0 千克，比对照增产 2.8%；2025 年生产试验，平均亩产 590.6 千克，比对照宜优 673 增产 14.8%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般6月中下旬7月上旬播种，秧田播种量每亩10千克，大田亩用种量1~1.25千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄5.5叶左右，秧龄控制在30天以内。栽插株行距20厘米×20厘米，每蔸插2~3粒谷秧，每亩插足基本苗6万以上。③水肥管理。科学施肥，施足基肥，早施追肥，亩施纯氮12千克，氮、磷、钾比例为1:0.5:0.8。常规水分管理，收割前7~10天断水。④病虫害防治。重点防治白叶枯病、稻飞虱等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：山两优5111符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作晚稻种植。经投票，同意14票，不同意0票，通过初审。同意报请福建省农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

35. 品种名称：特优9816

申请者：福建省农业科学院水稻研究所

育种者：福建省农业科学院水稻研究所

品种来源：龙特甫A×JR816

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期123.7天，比对照宜优673迟熟1.0天。平均株高113.3厘米，穗长22.8厘米，每亩有效穗数17.1万穗，每穗总粒数180.4粒，结实率83.4%，千粒重30.5克。稻瘟病综合指数两年分别为2.3、2.8，穗颈瘟损失率最高级3级，中抗稻瘟病；高感白叶枯病；中抗稻飞虱。
米质主要指标：糙米率83.9%，整精米率47.5%，粒长6.5毫米，长宽

比 2.3，垩白度 25.8%，透明度 3 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 62 毫米，直链淀粉含量 25.6%。米质达部颁普通食用稻品种品质标准。

产量表现:2024 年参加福建丰源科企水稻品种试验联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 576.4 千克，比对照宜优 673 增产 11.1%；2025 年续试，平均亩产 610.4 千克，比对照宜优 673 增产 10.3%；两年区域试验平均亩产 595.2 千克，比对照增产 10.7%；2025 年生产试验，平均亩产 570.8 千克，比对照宜优 673 增产 16.3%。

栽培技术要点:①播种时间与播种量。在福建省作晚稻种植，一般 5 月下旬至 6 月中旬播种，秧田播种量每亩 15 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 16.7 厘米×23.1 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，早施分蘖肥，亩施纯氮 12 千克，氮、磷、钾比例 1:0.5:0.8 为宜。常规水管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治白叶枯病和螟虫等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见:特优 9816 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作晚稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

36. 品种名称: 锦两优丝苗

申请者: 福建农林大学

育种者: 福建农林大学

品种来源：锦 S × 乌山丝苗

特征特性：属籼型两系杂交水稻品种。福建省作晚稻种植，平均全生育期 123.5 天，比对照宜优 673 迟熟 0.7 天。平均株高 110.2 厘米，穗长 24.6 厘米，每亩有效穗数 18.4 万穗，每穗总粒数 166.8 粒，结实率 80.6%，千粒重 26.2 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.7、2.9，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；中抗白叶枯病；高感稻飞虱。米质主要指标：糙米率 82.5%，整精米率 61.3%，粒长 7.7 毫米，长宽比 3.6，垩白度 1.0%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 63 毫米，直链淀粉含量 16.3%。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2024 年参加福建金泰科企水稻品种试验联合体省晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 550.3 千克，比对照宜优 673 增产 3.1%；2025 年续试，平均亩产 531.4 千克，比对照宜优 673 增产 4.2%；两年区域试验平均亩产 540.8 千克，比对照增产 3.7%；2025 年生产试验，平均亩产 546.7 千克，比对照宜优 673 增产 4.3%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量：在福建省作晚稻种植，一般 6 月上旬~7 月上旬播种，秧田播种量每亩 12 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度：水育秧移栽叶龄 4.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每蔸插 2~3 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。。③水肥管理：科学施肥，亩施纯氮 9 千克，施足基肥，早施分蘖肥。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治：重点防治纹枯病、稻飞虱、螟虫等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：锦两优丝苗符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作晚稻种植。经投票，

同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

37. 品种名称：品香优 808

申请者：福建省农业科学院水稻研究所

育种者：福建省农业科学院水稻研究所、四川省农业科学院水稻高粱研究所（四川省农业科学院德阳分院）

品种来源：品香 A × 福恢 808

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期 178.6 天，比对照元丰优 86 迟熟 8.8 天。平均株高 153.0 厘米，穗长 29.8 厘米，每亩有效穗数 16.6 万穗，每穗总粒数 231.7 粒，结实率 82.0%，千粒重 28.7 克。稻瘟病综合指数两年分别为 2.4、2.6，穗颈瘟损失率最高级 3 级，中抗稻瘟病；感白叶枯病；高感褐飞虱。米质主要指标：糙米率 82.6%，整精米率 66.1%，粒长 7.4 毫米，长宽比 3.2，垩白度 0.8%，透明度 2 级，碱消值 5.2 级，胶稠度 78 毫米，直链淀粉含量 13.6%。米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加感光中稻组品种自主试验，平均亩产 614.5 千克，比对照元丰优 86 增产 8.7%；2024 年续试，平均亩产 591.2 千克，比对照元丰优 86 增产 13.6%；两年区域试验平均亩产 602.9 千克，比对照增产 11.2%；2025 年生产试验，平均亩产 592.9 千克，比对照元丰优 86 增产 10.6%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作中稻种植，一般4月中旬至5月中旬播种，秧田播种量每亩10千克，大田亩用种量1~1.25千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄5.5叶左右，秧龄控制在30天以内。栽插株行距23.3厘米×23.3厘米，每蔸插2粒谷秧，每亩插足基本苗6万以上。③水肥管理。科学施肥，亩施纯氮10千克以内，后期切忌偏氮，施足基肥，早施分蘖肥。常规水分管理，收割前7~10天断水。④病虫害防治。重点防治稻曲病、白叶枯病、纹枯病、稻飞虱、螟虫等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：品香优808符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作中稻种植。经投票，同意14票，不同意0票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

38. 品种名称：青香优808

申请者：福建省农业科学院水稻研究所

育种者：福建省农业科学院水稻研究所、广东鲜美种苗股份有限公司

品种来源：青香A×福恢808

特征特性：属籼型三系杂交水稻品种。福建省作中稻种植，平均全生育期180.1天，比对照元丰优86迟熟10.2天。平均株高152.3厘米，穗长29.2厘米，每亩有效穗数16.3万穗，每穗总粒数228.0粒，结实率84.1%，千粒重26.6克。稻瘟病综合指数两年分别为2.0、2.7，穗颈瘟损失率最高级3级，中抗稻瘟病；感白叶枯病；高感褐飞

虱。米质主要指标：糙米率 80.5%，整精米率 62.0%，粒长 7.3 毫米，长宽比 3.4，垩白度 1.2%，透明度 2 级，碱消值 5.7 级，胶稠度 79 毫米，直链淀粉含量 14.0%，香味值 78.0 分。米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。

产量表现：2023 年参加感光中稻组自主区域试验，平均亩产 598.5 千克，比对照元丰优 86 增产 5.9%；2024 年续试，平均亩产 568.9 千克，比对照元丰优 86 增产 9.3%；两年区域试验平均亩产 583.7 千克，比对照增产 7.6%；2025 年生产试验，平均亩产 585.1 千克，比对照元丰优 86 增产 9.2%。

栽培技术要点：①播种时间与播种量。在福建省作中稻种植，一般 4 月中旬至 5 月中旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。②移栽时间与种植密度。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 23.3 厘米×23.3 厘米，每蔸插 2 粒谷秧，每亩插足基本苗 6 万以上。③水肥管理。科学施肥，亩施纯氮 10 千克以内，后期切忌偏氮，施足基肥，早施分蘖肥。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。④病虫害防治。重点防治稻曲病、白叶枯病、纹枯病、稻飞虱、螟虫等病虫害。

省农作物品种审定委员会水稻专业委员会初审意见：青香优 808 符合福建省水稻品种审定标准，适宜在福建省作中稻种植。经投票，同意 14 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

二、玉米

39. 品种名称：闽甜糯 535

申请单位：福建省农业科学院作物研究所

选育单位：福建省农业科学院作物研究所

品种来源：闽糯系 WF19 × 闽甜系 S149

特征特性：属鲜食甜加糯玉米品种。春播出苗至鲜穗采收平均 82.4 天，比对照万农甜糯 158 晚熟 1.8 天。幼苗叶鞘绿色，叶片绿色，花药绿色，颖壳绿色，花丝绿色。株型半紧凑，平均株高 215.1 厘米，穗位高 76.7 厘米，果穗长筒型，穗长 19.6 厘米，穗粗 5.4 厘米，秃尖长 0.9 厘米，穗行数 14.4 行，行粒数 35.7 粒，白粒白轴，鲜百粒重 40.2 克，鲜出籽率 64.4%。倒伏率 0.3%，倒折率 0.0%。两年田间调查抗纹枯病、中抗小斑病、中抗大斑病、抗南方锈病、抗茎腐病、抗粗缩病；接种鉴定感纹枯病、中抗小斑病、中抗大斑病、高感南方锈病、高感腐霉茎腐病。品质分析：皮渣率 11.38%，支链淀粉占总淀粉含量 98.58%。外观与品尝鉴定 86.9 分。

产量表现：2024 年参加福建省鲜食糯玉米区试，鲜果穗平均亩产 1033.7 千克，比对照万农甜糯 158 增产 6.6%。2025 年续试，鲜果穗平均亩产 1096.6 千克，比对照万农甜糯 158 增产 3.9%。两年平均鲜果穗亩产 1065.2 千克，比对照增产 5.2%。

栽培技术要点：福建省春播 3 月中旬至 4 月中旬。与其它玉米采取空间或时间隔离，防止串粉。亩种植密度 3000 ~ 3200 株。春播多雨注意排水。施足基肥，基肥以有机肥为主，并亩施氮磷钾复合肥 30 ~ 35 千克，酸性土壤宜增施土壤调节剂；拔节期结合中耕培土增施尿素 10 千克、复合肥 15 千克；大喇叭口期后增施尿素 10 千克、复合肥 10

千克；开花前后增施钾肥，亩用量 10 千克。注意防治纹枯病、南方锈病、茎腐病、玉米螟等病虫害。春播一般在吐丝后 20 天采收。

省主要农作物品种审定委员会玉米与大豆专业委员会初审意见：
闽甜糯 535 符合福建省鲜食玉米品种审定标准，适宜福建省作鲜食玉米种植。经投票，同意 13 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

40. 品种名称：福宝甜糯 223

申请单位：福建省农业科学院作物研究所

选育单位：福建省农业科学院作物研究所、福州立信种苗有限公司

品种来源：闽糯系 WF19 × 闽甜系 S223

特征特性：属鲜食甜加糯玉米品种。春播出苗至鲜穗采收平均 83.6 天，比对照万农甜糯 158 晚熟 2.9 天。幼苗叶鞘绿色，叶片绿色，花药绿色，颖壳绿色，花丝绿色。株型半紧凑，平均株高 224.3 厘米，穗位高 80.5 厘米，果穗长筒型，穗长 20.0 厘米，穗粗 5.3 厘米，秃尖长 0.1 厘米，穗行数 14.5 行，行粒数 37.9 粒，白粒白轴，鲜百粒重 38.3 克，鲜出籽率 62.3%。倒伏率 0.0%，倒折率 0.0%。两年田间调查抗纹枯病、抗小斑病、抗大斑病、抗南方锈病、抗茎腐病、抗粗缩病；接种鉴定感纹枯病、感小斑病、中抗大斑病、感南方锈病、中抗茎腐病。品质分析：皮渣率 11.55%，支链淀粉占总淀粉含量 98.62%。外观与品尝鉴定 86.9 分。

产量表现：2024年参加福建省鲜食糯玉米区试，鲜果穗平均亩产1028.2千克，比对照万农甜糯158增产6.0%。2025年续试，鲜果穗平均亩产1112.0千克，比对照万农甜糯158增产5.4%。两年平均鲜果穗亩产1070.1千克，比对照增产5.7%。

栽培技术要点：福建省春播3月中旬至4月中旬。与其它玉米采取空间或时间隔离，防止串粉。亩种植密度3000~3200株。春播多雨注意排水。施足基肥，基肥以有机肥为主，并亩施氮磷钾复合肥30~35千克，酸性土壤宜增施土壤调节剂；拔节期结合中耕培土增施尿素10千克、复合肥15千克；大喇叭口期后增施尿素10千克、复合肥10千克；开花前后增施钾肥，亩用量10千克。注意防治纹枯病、小斑病、南方锈病、玉米螟等病虫害。春播一般在吐丝后20天采收。

省主要农作物品种审定委员会玉米与大豆专业委员会初审意见：福宝甜糯223符合福建省鲜食玉米品种审定标准，适宜福建省作鲜食玉米种植。经投票，同意13票，不同意0票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

41. 品种名称：闽双色9号

申请单位：福建省农业科学院作物研究所

选育单位：福建省农业科学院作物研究所、浙江省农业科学院

品种来源：闽甜系AS67×12hi307

特征特性：属鲜食甜玉米品种。春播出苗至鲜穗采收平均75.9天，比对照闽双色6号早熟1.9天。幼苗叶鞘绿色，叶片绿色，花药绿色，颖壳绿色，花丝绿色。株型半紧凑，平均株高218.7厘米，穗

位高 70.5 厘米，果穗长筒型，穗长 19.5 厘米，穗粗 5.3 厘米，秃尖长 1.0 厘米，穗行数 15.3 行，行粒数 37.1 粒，黄白粒白轴，鲜百粒重 44.1 克，鲜出籽率 69.6%。倒伏率 4.2%，倒折率 0.8%。两年田间调查抗纹枯病、抗小斑病、抗大斑病、抗南方锈病、抗茎腐病、抗粗缩病；接种鉴定中抗纹枯病、中抗小斑病、中抗大斑病、感南方锈病、感腐霉茎腐病。品质分析：皮渣率 8.97%，可溶性总糖 14.04%，还原糖 3.89%。外观与品尝鉴定 88.5 分。

产量表现：2024 年参加福建省“闽鲜玉”科企联合体甜玉米新品种区试，鲜果穗平均亩产 1102.4 千克，比对照闽双色 6 号增产 4.4%。2025 年续试，鲜果穗平均亩产 1125.0 千克，比对照闽双色 6 号增产 5.1%。两年平均鲜果穗亩产 1113.7 千克，比对照增产 4.7%。

栽培技术要点：福建省春播 3 月中旬至 4 月中旬。与其它玉米采取空间或时间隔离，防止串粉。亩种植密度 3000~3200 株。春播多雨注意排水。施足基肥，基肥以有机肥为主，并亩施氮磷钾复合肥 30~35 千克，酸性土壤宜增施土壤调节剂；拔节期结合中耕培土亩增施尿素 10 千克、复合肥 15 千克；大喇叭口期后亩增施尿素 10 千克、复合肥 10 千克；开花前后增施钾肥，亩用量 10 千克。注意防治南方锈病、茎腐病、玉米螟等病虫害。春播一般在吐丝后 20 天左右采收。

省主要农作物品种审定委员会玉米与大豆专业委员会初审意见：闽双色 9 号符合福建省鲜食玉米品种审定标准，适宜福建省作鲜食玉米种植。经投票，同意 13 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

42. 品种名称：浙甜 1902

申请单位：浙江省农业科学院

选育单位：浙江省农业科学院

品种来源：GN5 × 17hi264

特征特性：属鲜食甜玉米品种。春播出苗至鲜穗采收平均 75.6 天，比对照闽双色 6 号短 2.2 天。幼苗叶鞘绿色，叶片绿色，花药绿色，颖壳绿色，花丝绿色。株型半紧凑，平均株高 205.2 厘米，穗位高 61.5 厘米，果穗长筒型，穗长 21.1 厘米，穗粗 5.4 厘米，秃尖长 1.1 厘米，穗行数 15.7 行，行粒数 38.2 粒，黄白粒白轴，鲜百粒重 42.6 克，出籽率 64.4%。倒伏率 0.0%，倒折率 0.0%。两年田间调查抗纹枯病、抗小斑病、抗大斑病、抗南方锈病、抗茎腐病、抗粗缩病；接种鉴定感纹枯病、感小斑病、抗大斑病、高感南方锈病、中抗腐霉茎腐病。品质分析：皮渣率 7.38%，可溶性总糖 19.98%，还原糖 5.47%。外观与品尝鉴定 88.1 分。

产量表现：2024 年参加福建省“闽鲜玉”科企联合体甜玉米新品种区域试验，鲜果穗平均亩产 1154.7 千克，比对照闽双色 6 号增产 9.4%。2025 年续试，鲜果穗平均亩产 1138.2 千克，比对照闽双色 6 号增产 6.3%。两年平均鲜果穗亩产 1146.5 千克，比对照增产 7.8%。

栽培技术要点：福建省春播 3 月中旬至 4 月中旬，与其它玉米采取空间或时间隔离，防止串粉。亩种植密度 3000 ~ 3200 株。春播多雨注意排水。施足基肥，基肥以有机肥为主，并亩施氮磷钾复合肥 30 ~ 35 千克，酸性土壤宜增施土壤调节剂；拔节期结合中耕培土增施尿素 10 千克、复合肥 15 千克；大喇叭口期后增施尿素 10 千克、复合肥 10

千克；开花前后增施钾肥，亩用量 10 千克。注意防治纹枯病、小斑病、南方锈病、草地贪夜蛾等病虫害。春播一般在吐丝后 20 天采收。

主要农作物品种审定委员会玉米与大豆专业委员会初审意见：浙甜 1902 符合福建省鲜食玉米品种审定标准，适宜福建省作鲜食玉米种植。经投票，同意 13 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

三、大豆

43. 品种名称：闽豆 17

申请单位：福建省农业科学院作物研究所

选育单位：福建省农业科学院作物研究所

品种来源：沪选 26-19/浙鲜 5 号

特征特性：属春大豆菜用型品种。春播出苗至采青平均日数 72.3 天，比对照毛豆 3 号早熟 0.5 天。株型收敛，有限结荚习性，叶形椭圆，幼茎紫色，花紫色，茸毛灰色，籽粒椭圆，鲜籽粒淡绿色，无脐色。成熟籽粒种皮淡绿色，脐蓝色，子叶黄色。平均株高 51.0 厘米，茎粗 0.67 厘米，底荚高度 11.3 厘米，主茎节数 9.0 个，单株有效分枝数 3.3 个、有效荚数 28.3 个、标准荚数 17.9 个，标准荚长 5.30 厘米、宽 1.41 厘米，每千克标准荚数 333.9 个，标准荚率 70.2%；单株荚重 68.6 克，鲜百粒重 76.1 克。接种鉴定表现中感炭疽病、中感花叶病毒病 15 号株系、中抗花叶病毒病 18 号株系。品质检测：每 100 克鲜籽粒含可溶性糖 2.4 克、淀粉 5.9 克、蛋白质 15.0 克、脂肪 4.5 克、水分 66.4 克。

产量表现: 2023年参加福建省菜用大豆新品种区域试验, 平均鲜荚亩产量747.7千克, 比对照毛豆3号增产15.5%, 增产极显著; 2024年续试, 鲜荚亩产量790.5千克, 比对照毛豆3号增产13.9%, 增产极显著。两年平均鲜荚亩产量为769.1千克, 比对照增产10.7%, 标准荚亩产量564.2千克, 比对照增产9.3%。

栽培技术要点: 选择排灌条件好、耕层深厚、肥力中等以上土壤, 一般于3月上旬至4月上旬直播。采取“窄畦双行穴播”种植, 畦宽带沟90厘米左右, 每穴留苗2株, 亩种植密度1.3万株左右, 视土壤肥力酌情而定。播种后3天内, 湿润土壤表层封施大豆专用除草剂进行封闭处理, 控制前期杂草。苗期注意排涝, 并防治蚜虫减少病毒病传播危害。在初花期, 视植株长势结合浅耕除草适当增施磷钾肥。结荚鼓粒期注意排除田间积水, 遇旱及时灌水, 并注意防治炭疽病及虫鼠害。在全田荚果鼓粒达80%、荚壳翠绿时采收。

省主要农作物品种审定委员会玉米与大豆专业委员会初审意见: 闽豆17符合福建省大豆品种审定标准, 适宜福建省作鲜食大豆春播种植。经投票, 同意13票, 不同意0票, 通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

44. 品种名称: 福夏豆9号

申请单位: 福建省农业科学院作物研究所、南京农业大学

选育单位: 福建省农业科学院作物研究所、南京农业大学

品种来源: 南农10-1/南农99-6

特征特性: 属夏大豆普通型品种。夏播出苗至成熟88.7天, 比对

照华夏 10 号早熟 8.5 天。株型收敛，有限结荚习性，叶椭圆型，幼茎绿色，花白色，茸毛棕色，荚熟色褐色，籽粒椭圆，脐褐色，子叶黄色，种皮黄色且具微光泽。平均株高 69.3 厘米，底荚高度 9.3 厘米，主茎节数 12.6 个，单株有效分枝 3.4 个，有效荚数 57.9 个，单株粒数 121.4 粒，每荚粒数 2.2 粒，单株粒重 21.2 克，百粒重 17.8 克。接种鉴定表现中感炭疽病、中抗花叶病毒病 15 号株系、中抗花叶病毒病 18 号株系。品质检测：粗蛋白含量为 39.14%，粗脂肪含量为 21.26%。

产量表现：2023 年参加福建省夏大豆新品种区域试验，平均亩产量为 182.6 千克，比对照华夏 10 号增产 10.3%，增产极显著；2024 年续试，平均亩产量为 181.2 千克，比对照华夏 10 号增产 5.3%，增产极显著。两年平均亩产量为 181.9 千克，比对照增产 7.8%。2024 年生产试验，平均亩产量为 179.3 千克，比对照华夏 10 号增产 4.4%。

栽培技术要点：适时播种，一般 6 月中下旬至 7 月下旬播种。合理密植，亩种植密度 1.4 万株，低肥力地块适当增加密度。施足基肥，基肥以农家肥为主，根据土壤肥力水平，中等肥力地块亩配施三元复合肥 5~10 千克，低肥力地块亩配施尿素 5~6 千克、重过磷酸钙 30~40 千克、硫酸钾 40 千克。加强田间管理，预防炭疽病等病虫、草、鼠害。成熟后及时收获。

省主要农作物品种审定委员会玉米与大豆专业委员会初审意见：福夏豆 9 号符合福建省大豆品种审定标准，适宜福建省夏播种植。经投票，同意 13 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

45. 品种名称: 华夏 45

申请单位: 华南农业大学

选育单位: 华南农业大学

品种来源: 华夏 3 号/桂夏豆 2 号

特征特性: 属夏大豆普通型品种。夏播生育日数 94.9 天, 比对照华夏 10 号早熟 1.0 天。株型收敛, 有限结荚习性, 叶椭圆型, 幼茎绿色, 花白色, 茸毛棕色, 荚熟色褐色, 籽粒椭圆, 脐淡褐色, 子叶黄色, 种皮黄色且具微光泽。平均株高 61.0 厘米, 底荚高度 10.0 厘米, 主茎节数 14.0 个, 单株有效分枝 3.6 个, 有效荚数 69.9 个, 单株粒数 140.2 粒, 每荚粒数 2.1 粒, 单株粒重 21.6 克, 百粒重 15.8 克。接种鉴定表现抗炭疽病、中感花叶病毒病 15 号株系、中抗花叶病毒病 18 号株系。品质检测: 粗蛋白含量为 42.94%, 粗脂肪含量为 20.64%。

产量表现: 2024 年参加福建省夏大豆新品种区域试验, 平均亩产量为 194.4 千克, 比对照华夏 10 号增产 13.0%, 增产极显著; 2025 年续试, 平均亩产量为 215.3 千克, 比对照华夏 10 号增产 9.9%, 增产极显著。两年平均亩产量为 204.8 千克, 比对照华夏 10 号增产 11.3%。2025 年生产试验, 平均亩产量为 198.3 千克, 比对照华夏 10 号增产 7.9%。

栽培技术要点: 一般 6 月中旬至 7 月下旬播种, 条播行距 40 厘米、株距 10 厘米。高肥力地块亩种植密度 1.4 万株, 中等肥力地块 1.8 万株, 低肥力地块 2.0 万株。基肥以农家肥为主, 肥力高地块不需要施化肥, 中等肥力地块亩施氮磷钾三元复合肥 5~10 千克, 低肥力地块亩施尿素 5~6 千克、重过磷酸钙 30~40 千克、硫酸钾 40 千克作基

肥。加强田间管理，注意灌排水及防治病虫、草、鼠害。成熟后及时收获。

省主要农作物品种审定委员会玉米与大豆专业委员会初审意见：华夏 45 符合福建省大豆品种审定标准，适宜福建省夏播种植。经投票，同意 13 票，不同意 0 票，通过初审。同意报请福建省主要农作物品种审定委员会主任委员会予以审核。

附件 3

福建省第十二批拟撤销审定（引种备案） 的主要农作物品种目录

序号	作物类型	品种名称	审定（引种）编号	选育单位
1	水稻	特优 388	闽审稻 1999006	南平市农科所
2	水稻	II 优 125	闽审稻 2006028	南平市农科所
3	水稻	中优 186	闽审稻 2005H01(南平)	福建省南平市农业科学研究所
4	水稻	两优多系 1 号	闽审稻 2006020	福建旺穗种业有限公司、福建省农科院水稻所
5	水稻	特优 180	闽审稻 2008017	福建省南平市农业科学研究所
6	水稻	谷优 596	闽审稻 2009004	福建省南平市农业科学研究所
7	水稻	泸优 2013	闽审稻 2012A03(福州)	福建省农业科学院水稻研究所
8	水稻	成优 0504	闽审稻 2015021	福建省农业科学院水稻研究所
9	水稻	M76 优 3301	闽审稻 2016002	福建农林大学作物科学学院、福建省农业科学院生物技术研究所
10	水稻	赣优 676	闽审稻 2016003	福建兴禾种业科技有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、江西省农业科学院水稻研究所
11	水稻	宜优 2013	闽审稻 2016019	福建省农业科学院水稻研究所
12	水稻	恒丰优 342	闽审稻 20170001	福建省农业科学院水稻研究所、广东粤良种业有限公司
13	水稻	谷优 644	闽审稻 20170003	福州市闽佳农作物科学研究所、福建省农业科学院水稻研究所
14	水稻	广优 688	闽审稻 20170004	福建省南平市农业科学研究所
15	水稻	齐两优 676	闽审稻 20170005	福建禾丰种业股份有限公司、福建省农业科学院水稻研究所
16	水稻	广两优 6869	闽审稻 20170010	福建禾丰种业股份有限公司
17	水稻	臻优 727	闽审稻 20170011	福建省农业科学院水稻研究所、四川省农业科学院作物研究所、福建农科农业良种开发有限公司
18	水稻	两优 3995	闽审稻 20170014	福建农林大学作物科学学院、福建农科农业良种开发有限公司
19	水稻	旺两优 338	闽审稻 20180004	福建旺穗种业有限公司、福建省农业科学院水稻研究所
20	水稻	M76 优 212	闽审稻 20180007	福建亚丰种业有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、福建农林大学作物科学学院
21	水稻	广两优 769	闽审稻 20180010	福建省南平市农业科学研究所

序号	作物类型	品种名称	审定（引种）编号	选育单位
22	水稻	金岩优 2050	闽审稻 20180011	福建农林大学作物科学学院、中种集团福建农嘉种业股份有限公司
23	水稻	荃优 175	闽审稻 20180012	中国种子集团有限公司福建分公司、福建省农业科学院水稻研究所、安徽荃银高科种业股份有限公司、中国种子集团有限公司、福建农林大学作物科学学院、福建省南平市农业科学研究所
24	水稻	天优 109	闽审稻 20180014	漳州市农业科学研究所、广东省农业科学院水稻研究所
25	水稻	紫两优 3 号	闽审稻 20180024	中种集团福建农嘉种业股份有限公司
26	水稻	金泰优 683	闽审稻 20190005	福建农林大学作物科学学院、中种集团福建农嘉种业股份有限公司、福建省农业科学院水稻研究所
27	水稻	农优 683	闽审稻 20190014	福建禾丰种业股份有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、福建农林大学作物科学学院
28	水稻	T 两优 653	闽审稻 20190015	福建旺福农业发展有限公司
29	水稻	T 两优 4159	闽审稻 20190016	福建六三种业有限责任公司
30	水稻	臻优 683	闽审稻 20190019	福建禾丰种业股份有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、福建农林大学作物科学学院
31	水稻	明 2 优明占	闽审稻 20190020	福建六三种业有限责任公司
32	水稻	金泰优 2453	闽审稻 20190022	福建农林大学作物科学学院
33	水稻	B 两优 164	闽审稻 20190024	三明市农业科学研究院
34	水稻	荃优 639	闽审稻 20190027	福建省农业科学院水稻研究所
35	水稻	澜优粤禾丝苗	闽审稻 20190031	福建省农业科学院水稻研究所
36	水稻	潢优 164	闽审稻 20190034	福建农乐种业有限公司
37	水稻	伍天优 713	闽审稻 20190035	福建神农大丰种业科技有限公司、泉州市农业科学研究所
38	水稻	农优 212	闽审稻 20190038	福建省农业科学院水稻研究所
39	水稻	恒丰优 371	闽审稻 20200002	福建省农业科学院水稻研究所
40	水稻	赣优 7319	闽审稻 20200003	福建省农业科学院水稻研究所
41	水稻	金泰优 2050	闽审稻 20200004	福建农林大学农学院
42	水稻	律优 308	闽审稻 20200005	福建亚丰种业有限公司
43	水稻	五丰优 450	闽审稻 20200006	建宁县里心镇三丰优质稻米研究中心
44	水稻	金泰优 2877	闽审稻 20200008	中种集团福建农嘉种业股份有限公司
45	水稻	18 优华占	闽审稻 20200013	福建旺穗种业有限公司

序号	作物类型	品种名称	审定(引种)编号	选育单位
46	水稻	广优 618	闽审稻 20200016	福建科力种业有限公司、福建省南平市农业科学研究所、三明市农业科学研究院
47	水稻	宁 12 优黑 807	闽审稻 20200022	宁德市农业科学研究所
48	水稻	创源优 918	闽审稻 20200025	福建农乐种业有限公司
49	水稻	恒丰优 6107	闽审稻 20200029	福建省农业科学院水稻研究所
50	水稻	金泰优 156	闽审稻 20200030	宁德市农业科学研究所
51	水稻	金泰优 99	闽审稻 20200031	福建农林大学农学院
52	水稻	金泰优 1057	闽审稻 20200032	福建农林大学农学院
53	水稻	神农 39	闽审稻 20200036	福建神农大丰种业科技有限公司
54	水稻	广 8 优 1059	闽审稻 20200043	福建农林大学农学院
55	水稻	清香优 2 号	闽审稻 20200045	福建丰田种业有限公司
56	水稻	旗 5 优 862	闽审稻 20200046	福建金品农业科技股份有限公司
57	水稻	旗 5 优 661	闽审稻 20200048	福建省农业科学院水稻研究所
58	水稻	元两优 6503	闽审稻 20200050	福建禾丰种业股份有限公司
59	水稻	金岩优 683	闽审稻 20200051	福建农林大学农学院
60	水稻	内香优 6478	闽审稻 20200052	福建科力种业有限公司
61	水稻	福玖优 2165	闽审稻 20200053	福建省农业科学院水稻研究所
62	水稻	佳谷优金占	闽审稻 20200057	泉州市农业科学研究所、厦门大学生命科学院、福建神农大丰种业科技有限公司
63	水稻	恒丰优 712	闽审稻 20200062	福建省农业科学院水稻研究所
64	水稻	广 8 优 1131	闽审稻 20200065	福建农林大学农学院
65	水稻	紫两优 212	闽审稻 20200068	福建亚丰种业有限公司
66	水稻	清优粤禾丝苗	闽审稻 20210003	福建省农业科学院水稻研究所
67	水稻	荃优 6863	闽审稻 20210009	福建禾丰种业股份有限公司
68	水稻	两优 8676	闽审稻 20210010	福建禾丰种业股份有限公司
69	水稻	旌 3 优 164	闽审稻 20210011	福建农乐种业有限公司
70	水稻	元两优 1725	闽审稻 20210012	福建省农业科学院水稻研究所
71	水稻	甬优 1202	闽审稻 20210016	宁波种业股份有限公司
72	水稻	元两优 801	闽审稻 20210020	福建省农业科学院水稻研究所
73	水稻	恒优丝占	闽审稻 20210021、(闽)引种〔2018〕第 1 号、赣审稻 20170038	中种集团福建农嘉种业股份有限公司
74	水稻	农紫优 1131	闽审稻 20210025	福建禾丰种业股份有限公司、福建农林大学农学院
75	水稻	品两优明占	闽审稻 20210028	福建金品农业科技股份有限公司
76	水稻	德香优 4 号	闽审稻 20210035	福建亚丰种业有限公司
77	水稻	百优中占	闽审稻 20210040	福建神农大丰种业科技有限公司
78	水稻	五优 618	闽审稻 20210046	福建省农业科学院生物技术研究所

序号	作物类型	品种名称	审定(引种)编号	选育单位
79	水稻	华元优 466	闽审稻 20210050	科荟种业股份有限公司
80	水稻	广 8 优 699	闽审稻 20220021	中国种子集团有限公司福建分公司
81	水稻	福元优 2165	闽审稻 20220083	福建省农业科学院水稻研究所
82	水稻	茂香优 2165	闽审稻 20220084	福建省农业科学院水稻研究所
83	水稻	两优 456	闽种引稻(2014)第 002 号、浙审稻 2008010	福建省农业科学院水稻研究所
84	水稻	安优 18	闽种引稻(2015)第 005 号、浙审稻 2013015	浙江可得丰种业有限公司
85	水稻	E 两优 476	(闽)引种〔2017〕第 001 号,鄂审稻 2016006	福建农乐种业有限公司
86	水稻	隆两优 281	(闽)引种〔2017〕第 001 号,鄂审稻 2016010	四川隆平高科种业有限公司
87	水稻	Y 两优 5867	(闽)引种〔2017〕第 001 号,赣审稻 2010002	福建亚丰种业有限公司
88	水稻	岳优 617	(闽)引种〔2017〕第 001 号,赣审稻 2010016	中种集团福建农嘉种业股份有限公司
89	水稻	两优 33	(闽)引种〔2017〕第 001 号,赣审稻 2012014	湖北中香农业科技股份有限公司
90	水稻	徽两优 9810	(闽)引种〔2017〕第 001 号,赣审稻 2015001	福建闽紫种业有限公司
91	水稻	欣优 827	(闽)引种〔2017〕第 001 号,赣审稻 2015019	福建亚丰种业有限公司
92	水稻	泸优 069	(闽)引种〔2017〕第 001 号,桂审稻 2012022	福建亚丰种业有限公司
93	水稻	中浙 2 优 58	(闽)引种〔2017〕第 001 号,琼审稻 2014005	福建金山都发展有限公司
94	水稻	两优 98816	(闽)引种〔2017〕第 001 号,皖稻 2014011	福建科力种业有限公司
95	水稻	隆两优 866	(闽)引种〔2017〕第 001 号,皖稻 2016011	福建科力种业有限公司
96	水稻	Y 两优 7 号	(闽)引种〔2017〕第 001 号,湘审稻 2008017	漳州市星月农业种植有限公司
97	水稻	Y 两优 696	(闽)引种〔2017〕第 001 号,湘审稻 2010016	湖南奥谱隆科技股份有限公司
98	水稻	两优早 17	(闽)引种〔2017〕第 001 号,湘审稻 2014001	中种集团福建农嘉种业股份有限公司

序号	作物类型	品种名称	审定(引种)编号	选育单位
99	水稻	深两优 1813	(闽)引种〔2017〕第001号,湘审稻 2015016	湖南隆平种业有限公司
100	水稻	深两优 876	(闽)引种〔2017〕第001号,湘审稻 2015018	湖南广阔天地科技有限公司
101	水稻	深优 9716	(闽)引种〔2017〕第001号,粤审稻 2013039	福建省福瑞华安种业科技有限公司
102	水稻	钱优 930	(闽)引种〔2017〕第001号,浙审稻 2013018	福建六三种业有限责任公司
103	水稻	Y 两优 8199	(闽)引种〔2017〕第001号,浙审稻 2016011	福建金山都发展有限公司
104	水稻	未两优 211	(闽)引种〔2017〕第001号、(闽)引种〔2018〕第1号、皖稻 2016013	福建超大现代种业有限公司
105	水稻	特优 969	(闽)引种〔2017〕第001号、桂审稻 2008010号	福建禾丰种业股份有限公司
106	水稻	野香优 2号	(闽)引种〔2017〕第001号、桂审稻 2013010号	福建禾丰种业股份有限公司
107	水稻	Y 两优 837	(闽)引种〔2017〕第001号、湘审稻 2015012	湖南广阔天地科技有限公司
108	水稻	华优 638	(闽)引种〔2017〕第001号、粤审稻 2006033	漳州市星月农业种植有限公司
109	水稻	鑫两优 318	(闽)引种〔2018〕第1号,皖稻 2014012	谢华安种业科技(福建)有限公司
110	水稻	浙两优 274	(闽)引种〔2018〕第1号,浙审稻 2017006	浙江农科种业有限公司
111	水稻	长优 2号	(闽)引种〔2018〕第1号,浙审稻 2017018	金华三才种业公司
112	水稻	两优 234	(闽)引种〔2018〕第1号、鄂审稻 2010005	武汉国英种业有限责任公司
113	水稻	珞优 9348	(闽)引种〔2018〕第1号、鄂审稻 2016014	武汉国英种业有限责任公司
114	水稻	隆两优 1146	(闽)引种〔2018〕第1号、鄂审稻 2017007	四川隆平高科种业有限公司
115	水稻	徽两优 280	(闽)引种〔2018〕第1号、赣审稻 20170011	江西金信种业有限公司
116	水稻	晶两优 641	(闽)引种〔2018〕第1号、赣审稻 20170013	湖南百分农业科技有限公司

序号	作物类型	品种名称	审定(引种)编号	选育单位
117	水稻	唐两优 280	(闽)引种〔2018〕第1号、赣审稻 20170018	江西金信种业有限公司
118	水稻	特优 315	(闽)引种〔2018〕第1号、琼审稻 2013016	福建神农大丰种业科技有限公司
119	水稻	Y 两优 1500	(闽)引种〔2018〕第1号、皖稻 2016003	安徽理想种业有限公司
120	水稻	望两优 361	(闽)引种〔2018〕第1号、皖审稻 2017016	湖南希望种业科技股份有限公司
121	水稻	陵两优 229	(闽)引种〔2018〕第1号、湘审稻 2011008	四川隆平高科种业有限公司
122	水稻	C 两优 386	(闽)引种〔2018〕第1号、湘审稻 2014009	福建神农大丰种业科技有限公司
123	水稻	隆晶优 1 号	(闽)引种〔2018〕第1号、湘审稻 2015042	湖南亚华种业有限公司
124	水稻	力两优 1301	(闽)引种〔2018〕第1号、湘审稻 2016007	福建闽诚农业发展有限公司
125	水稻	Y 两优 1964	(闽)引种〔2018〕第1号、湘审稻 20170014	福建闽诚农业发展有限公司
126	水稻	内 5 优 8012	(闽)引种〔2018〕第1号、粤审稻 2011020	福建科力种业有限公司
127	水稻	五优 376	(闽)引种〔2018〕第1号、粤审稻 2012010	龙岩市鑫禾种业科技有限公司
128	水稻	聚两优 750	(闽)引种〔2018〕第1号、粤审稻 2013051	深圳仲帮农业科技发展有限公司
129	水稻	吉优 371	(闽)引种〔2018〕第1号、粤审稻 2015018	中种集团福建农嘉种业股份有限公司
130	水稻	特优 666	(闽)引种〔2018〕第1号、粤审稻 2015021	广东粤良种业有限公司
131	水稻	软华优 1179	(闽)引种〔2018〕第1号、粤审稻 2015041	福建禾丰种业股份有限公司
132	水稻	嘉早 37	(闽)引种〔2018〕第1号、浙审稻 2013002	浙江可得丰种业有限公司
133	水稻	甬优 7753	(闽)引种〔2018〕第2号、桂审稻 2018010	宁波市种子有限公司
134	水稻	群优 766	(闽)引种〔2018〕第2号、粤审稻 2016024	福建丰田种业有限公司
135	水稻	川种优 3877	(闽)引种〔2018〕第2号、粤审稻 20170029	中种集团福建农嘉种业股份有限公司
136	水稻	泰优航 1573	(闽)引种〔2019〕第1号、赣审稻 2016028	福建省福瑞华安种业科技有限公司
137	水稻	鄂香优华占	(闽)引种〔2019〕第1号、赣审稻 2016034	湖北鄂科华泰种业股份有限公司

序号	作物类型	品种名称	审定(引种)编号	选育单位
138	水稻	众优华占	(闽)引种〔2019〕第1号、赣审稻 20170046	福建省有家农业发展有限公司
139	水稻	两优 831	(闽)引种〔2019〕第1号、皖稻 2016006	福建闽诚农业发展有限公司
140	水稻	凤两优 464	(闽)引种〔2019〕第1号、湘审稻 20170011	中种集团福建农嘉种业股份有限公司
141	水稻	领优华占	(闽)引种〔2019〕第1号、湘审稻 20170036	湖南隆平种业有限公司
142	水稻	锦两优 1988	(闽)引种〔2019〕第1号、湘审稻 20180003	湖南百分农业科技有限公司
143	水稻	梦两优 5208	(闽)引种〔2019〕第1号、湘审稻 20180009	湖南隆平种业有限公司
144	水稻	吉丰优 1008	(闽)引种〔2019〕第1号、粤审稻 2013030	深圳仲帮农业科技发展有限公司
145	水稻	五丰优 587	(闽)引种〔2019〕第1号、粤审稻 2013033	福建亚丰种业有限公司
146	水稻	恒丰优 1179	(闽)引种〔2019〕第1号、粤审稻 20160038	广东华农大种业有限公司
147	水稻	韶优 766	(闽)引种〔2019〕第1号、粤审稻 20160046	福建丰田种业有限公司
148	水稻	金龙优 820	(闽)引种〔2019〕第1号、粤审稻 20170069	中种集团福建农嘉种业股份有限公司
149	水稻	泰优 871	(闽)引种〔2020〕第1号、赣审稻 2016029	福建禾丰种业股份有限公司
150	水稻	乾两优华占	(闽)引种〔2020〕第1号、赣审稻 20190023	福建亚丰种业有限公司
151	水稻	五乡优丝占	(闽)引种〔2020〕第1号、赣审稻 20190048	福建亚丰种业有限公司
152	水稻	新泰优丝占	(闽)引种〔2020〕第1号、赣审稻 20190059	福建亚丰种业有限公司
153	水稻	百香优 125	(闽)引种〔2020〕第1号、桂审稻 2017018号	中种集团福建农嘉种业股份有限公司
154	水稻	粳香优巴丝	(闽)引种〔2020〕第1号、桂审稻 2019103号	广西绿海种业有限公司
155	水稻	野香优新华粘	(闽)引种〔2020〕第1号、琼审稻 2018026号	福建禾丰种业股份有限公司
156	水稻	和两优 633	(闽)引种〔2020〕第1号、粤审稻 20180051	深圳市兆农农业科技有限公司

序号	作物类型	品种名称	审定(引种)编号	选育单位
157	水稻	两优 1318	(闽)引种〔2021〕第 1 号、鄂审稻 2016005	湖北金广农业科技有限公司
158	水稻	鄂香 2 号	(闽)引种〔2021〕第 1 号、鄂审稻 2018038	湖北中香农业科技股份有限公司
159	水稻	坤两优 1 号	(闽)引种〔2021〕第 1 号、赣审稻 20180028	福建亚丰种业有限公司
160	水稻	粳香优海丝	(闽)引种〔2021〕第 1 号、桂审稻 2019069 号	福建超大现代种业有限公司
161	水稻	香两优 16	(闽)引种〔2022〕第 1 号、鄂审稻 20200009	湖北中香农业科技股份有限公司
162	水稻	丝香优郁香	(闽)引种〔2022〕第 1 号、桂审稻 2020169 号	广西兆和种业有限公司
163	水稻	桃优 89	(闽)引种〔2022〕第 1 号、湘审稻 20190065	福建丰田种业有限公司
164	水稻	野优 5522	(闽)引种〔2022〕第 1 号、粤审稻 20190027	福建禾丰种业股份有限公司
165	水稻	禾香优 1 号	(闽)引种〔2022〕第 1 号、浙审稻 2020015	福建省农丰农业开发有限公司
166	玉米	都市丽人	闽审玉 2005003	海南绿川种苗有限公司
167	玉米	美玉 8 号	闽审玉 2011003	海南绿川种苗有限公司
168	玉米	雪玉糯 6 号	闽审玉 2011002	北京宝丰种子有限公司
169	玉米	金彩糯 670	闽审玉 2014003	北京金农科种子科技有限公司
170	玉米	金糯 685	闽审玉 2016005	北京金农科种子科技有限公司
171	玉米	宝甜	闽审玉 20180001	东阳市各邦种子商行
172	玉米	彩糯 17322	闽审玉 20180003	福建省农业科学院作物研究所
173	玉米	闽糯 811	闽审玉 20180005	福建省农业科学院作物研究所、福建省农业科学院生物技术研究所
174	玉米	翠甜 199	闽审玉 20180002	科荟种业股份有限公司
175	玉米	翠糯 163	闽审玉 20180004	科荟种业股份有限公司
176	玉米	晶煌 161	闽审玉 20210004	福州金苗种业有限公司
177	玉米	荟甜 9 号	闽审玉 20230004	科荟种业股份有限公司
178	玉米	金甜 678	闽种引玉〔2011〕第 001 号, 浙审玉 2005002	北京金农科种子科技有限公司
179	玉米	科糯 986	闽种引玉〔2011〕第 004 号, 浙品审字第 351 号	浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所
180	玉米	新中玉 801	(闽)引种〔2017〕第 001 号, 黔审玉 2011011	重庆中一种业有限公司

序号	作物类型	品种名称	审定（引种）编号	选育单位
181	玉米	金百甜 10 号	(闽)引种〔2017〕第 001 号,粤审玉 2015018	青岛金妈妈农业科技有限公司
182	玉米	绿领甜 3 号	(闽)引种〔2018〕第 002 号,苏审玉 200705	南京绿领种业有限公司
183	玉米	晶甜 9 号	(闽)引种〔2018〕第 001 号,皖玉 2016042	福建闽诚农业发展有限公司
184	玉米	金珍甜 1 号	(闽)引种〔2018〕第 001 号,浙审玉 2017003	浙江可得丰种业有限公司
185	大豆	浙农 6 号	(闽)引种〔2017〕第 001 号,浙审豆 2009001	福建超大现代种业有限公司
186	大豆	浙农 8 号	(闽)引种〔2017〕第 001 号,浙审豆 2009002	福建超大现代种业有限公司